



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

MASTIVEEX DRY

ANTIMASTITICO

Suspensión Intramamaria



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



MASTIVEEX DRY es una suspensión antimastítica a base de cloxacilina benzatina pertenece al grupo de las llamadas penicilinas antiestafilocócicas y se emplea, principalmente, en el caso de organismos resistentes a la bencilpenicilina (p. ej., *estafilococos*). está indicado en el tratamiento y la prevención de la mastitis subclínica durante el período seco causada por *estreptococos* y *estafilococos* sensibles a la cloxacilina (incluso las especies que sintetizan β -lactamas). Para la prevención de la mastitis durante el período seco causada por *Actinomyces* (*Corynebacterium*) *pyogenes* sensible a la cloxacilina y para prevenir la proliferación de patógenos. Se recomienda que se compruebe la susceptibilidad del microorganismo causal antes de comenzar el tratamiento.

COMPOSICIÓN

Cada inyector contiene de 5 g:

Cloxacilina (benzatinica).....	500 mg
Excipientes csp.....	5 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

Cloxacilina es una penicilina de acción bactericida y betalactamasa resistente. Ejerce su actividad antibacteriana actuando sobre la síntesis de la pared bacteriana. La cloxacilina reduce el desarrollo de la pared celular de bacterias interfiriendo con las transpeptidasas, enzimas responsables de la formación de enlaces entre las cadenas de peptidoglicano, lo que lleva a la lisis osmótica de la pared celular.

La cloxacilina es activa in vitro frente a bacterias grampositivas, incluyendo *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* y *Arcanobacterium pyogenes* (*Corynebacterium pyogenes*).

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovino (vacas en secado). ovinos y caprinos.

Para el tratamiento y prevención de mastitis en vacas durante el periodo de secado, causadas por *Corynebacterium pyogenes* (*Actinomyces pyogenes*), *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*, sensibles a cloxacilina.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de administración: intramamaria.

- ✓ Administrar el contenido de una jeringa de **MASTIVEEX DRY** a través del canal del pezón de cada cuarterón en dosis única inmediatamente después del último ordeño de la lactación, antes de iniciar el periodo de secado.
- ✓ Ordeñar a fondo antes de aplicar el tratamiento. Antes de administrar el medicamento, los pezones deben limpiarse concienzudamente y desinfectarse, y debe procederse con cuidado para evitar la contaminación de la boquilla de la jeringa.
- ✓ Administrar todo el contenido de una jeringa en cada cuarterón.
- ✓ Masajear después de aplicar el medicamento. Después de la administración se recomienda sumergir el pezón en un baño desinfectante autorizado. No ordeñar después del tratamiento.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En algunos casos puede provocar reacciones de hipersensibilidad en animales alérgicos a las penicilinas.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en vacas en periodo de lactación ni en aquellas que tengan un periodo de secado inferior a 35 días.
- × No usar en casos de hipersensibilidad a las penicilinas, cefalosporinas, o a algún excipiente.
- × No usar en vacas con mamitis clínicas fuera del periodo de secado.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, no se esperan reacciones adversas en caso de una sobredosificación accidental.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días. **Leche:** 4 días tras el parto cuando el periodo de secado es superior a 42 días.
46 días después del tratamiento cuando el periodo de secado es de 42 días o inferior.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ▶ Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano.
- ▶ El tratamiento debe realizarse al inicio del periodo de secado.
- ▶ La buena práctica clínica requiere basar el tratamiento en los ensayos de sensibilidad de las bacterias aisladas de los animales. Si esto no es posible, el tratamiento debe basarse en la información epidemiológica (regional, a nivel de explotación) sobre la sensibilidad de las diferentes cepas de las especies bacterianas habitualmente implicadas en el proceso infeccioso.
- ▶ Las personas con hipersensibilidad conocida al grupo de las penicilinas o de las cefalosporinas deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- ▶ Manipule este medicamento con cuidado para evitar la exposición. Use guantes y lávese las manos tras utilizar el medicamento.
- ▶ Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
- ▶ Si aparecen síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, consulte con un médico y muéstrole el prospecto o la etiqueta. La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves, que requieren atención médica urgente.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto:

Caja con 1 bandejas con 4 jeringas.

Caja con 4 bandejas con 6 jeringas (24 jeringas).

Caja con 10 bandejas con 4 jeringas (40 jeringas).

Caja con 20 bandejas con 4 jeringas (80 jeringas).

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0519484

