



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

MASTIVEEX LACTACIÓN

ANTIMASTITICO

Suspensión intramamaria



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



Mastiveex Lactación es una suspensión intramamaria especialmente formulada para su uso en vacas durante el período de lactancia. Su fórmula combina cloxacilina y ampicilina, lo que le permite combatir eficazmente un amplio espectro de bacterias responsables de la mastitis clínica.

Este tratamiento es efectivo contra microorganismos sensibles como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Arcanobacterium pyogenes* y *Escherichia coli*, proporcionando una solución segura y confiable para la salud mamaria de las vacas.

Gracias a su acción combinada, Mastiveex Lactación ayuda a controlar infecciones de manera efectiva, favoreciendo la recuperación y el bienestar del animal durante la etapa de producción de leche.

COMPOSICIÓN

Cloxacilina (sódica).....	200 mg
Ampicilina (sódica).....	75 mg
Excipientes csp.....	10 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

La ampicilina es un antibiótico de amplio espectro que actúa bloqueando la síntesis de la pared celular de las bacterias. Al impedir que estas formen una estructura resistente, las debilita hasta causar su muerte, lo que la hace eficaz contra una gran variedad de microorganismos.

Por otro lado, la cloxacilina está diseñada para atacar bacterias, incluyendo aquellas que han desarrollado resistencia a otros antibióticos. Su ventaja es que puede resistir las betalactamasas, unas enzimas que las bacterias producen para defenderse de los antibióticos. Al combinarse con la ampicilina, se obtiene un tratamiento más potente y eficaz contra diversas infecciones.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovino, ovino y caprino

Para el tratamiento de la mastitis clínica de animales en lactación.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramamaria.

Dosis vacas de leche:

Administrar el contenido de una jeringa (equivalente a 75 mg de ampicilina y 200 mg de cloxacilina) en cada cuarterón afectado cada 12 horas, durante 3 ordeños consecutivos.

Dosis ovejas y cabras:

Administrar el contenido de una jeringa (equivalente a 37,5 mg de ampicilina y 100 mg de cloxacilina) en cada pezón afectado cada 12 horas, durante 3 ordeños consecutivos.

Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el medicamento, lavar y desinfectar la ubre.

Tras aplicar el medicamento, efectuar un suave masaje de la ubre para favorecer la distribución de la suspensión.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Pueden producirse reacciones alérgicas en muy raras ocasiones.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en casos de hipersensibilidad a las penicilinas, las cefalosporinas o a algún excipiente.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, no obstante, de presentarse problemas de sobredosificación, realizar un tratamiento sintomático. Los síntomas de intoxicación consisten en temblor, convulsiones y coma.

TIEMPO DE RETIRO

Vacas:

- **Carne:** 7 días.
- **Leche:** 60 horas.

Ovejas y cabras:

- **Carne:** 11 días.
- **Leche:** 156 horas.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano.
- ✍ Llevar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento.
- ✍ Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
- ✍ No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 5 y 10 g en cajas de 4 y 80 jeringas.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0520313

