



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

MATAGUSANOS REVEEX

**CLORPIRIFOS (ORGANOFOSFORADO)
FLORFENICOL (ANTIBACTERIANO)**

Aerosol tópico

**MATAGUSANOS –LARVICIDA-REPELENTE
CICATRIZANTE-ANTIBIÓTICO-ANTISÉPTICO**

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

MATAGUSANOS REVEEX solución tópica en forma de aerosol, que actúa contra larvas de moscas que causan la enfermedad conocida como miasis de heridas (gusaneras) en animales domésticos (Caninos, Equinos, Porcinos, Bovinos, caprinos y ovinos). Su fórmula le confiere una acción insecticida, antibacteriana y antiséptica que hace que el producto sea eficiente en la prevención y tratamiento de infecciones en heridas.

COMPOSICIÓN

Clorpirifos.....	6,0 g
Florfenicol.....	1,0 g
Violeta de genciana.....	0,2 g
Aceite de pino.....	20 g
Excipientes c.s.p.....	100 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Clorpirifós es un insecticida organofosforado de acción tópica que actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, provocando una acumulación de acetilcolina en las sinapsis nerviosas de los insectos, lo que genera parálisis y muerte; mientras que el Florfenicol es un antibacteriano bacteriostático de amplio espectro que penetra en la célula bacteriana y se une de forma específica a la subunidad ribosomal 50S inhibiendo la síntesis de proteínas. La violeta de genciana es un colorante antiséptico del trifenilmetano, eficaz contra algunas bacterias Gram positivas, particularmente el *Staphylococcus spp.* y algunos hongos patógenos tales como *Cándida spp.*; es mucho menos activa contra esporas bacterianas y Gram negativos. El Aceite de pino.

Esta combinación resulta eficaz en el tratamiento de heridas infectadas y procesos parasitarios en animales de producción.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Caninos, Equinos, Porcinos, Bovinos, caprinos y ovinos**

En general se aplica para el tratamiento de gusaneras y heridas infectadas por larvas de gusanos de monte. Infecciones en heridas accidentales o quirúrgicas, castraciones, cortes de cola, descornado, despuntar, cura de ombligo.

MODO DE EMPLEO

Vía tópica.

Agitar el spray antes de usar; pulverizar la zona afectada desde una distancia de 15-20 centímetro, durante 2-3 segundos. Repetir el tratamiento según evolución y gravedad de las lesiones.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Reacciones cutáneas locales.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.

SOBREDOSIFICACIÓN

El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación.

En tratamientos continuados, pueden aparecer dermatopatías por hipersensibilidad, que desaparecen paulatinamente al suspender la medicación.

El clorpirifos es un compuesto organofosforado que inhibe la colinesterasa, su ingestión puede ser causa de intoxicación. Los antídotos específicos son la atropina y la pralidoxim.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 14 días. **Leche:** 24 horas.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Agitar antes de usar.
- Antes de la aplicación, limpiar la zona afectada, eliminando la suciedad y tejidos necrosados.
- No aplicar sobre los ojos, ya que puede aparecer una irritación local.
- Evitar el contacto o lamido de la zona afectada durante 5 minutos.

- Efectuar la pulverización del producto sobre los animales en zonas ventiladas. Evite la inhalación por rocío.
- Lavarse las manos después de aplicarlo.
- Almacenar lejos de alimentos y bebidas.
- No acariciar al animal hasta que esté completamente seco.
- No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.
- No fumar, no beber, ni comer durante su manipulación.
- No perforar el envase, ni quemar, ni exponerlo al sol.
- Desechar el envase vacío de forma segura.

¡ADVERTENCIA! Producto Moderadamente Tóxico clase II y requiere uso de equipo de protección personal para su uso (mascarilla, gafas, guantes, braga, botas). El clorpirifos es moderadamente tóxico en humanos; aunque mientras algunos organofosfatos son rápidamente absorbidos por la piel, los estudios en humanos indican que la absorción a través de la piel del clorpirifos es limitada.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 160 mL y 354 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN22N056308

