



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

NANDROL

ANDRÓGENO

Solución inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



NANDROL cuyo principio activo es nandrolona es un esteroide anabólico derivado de la testosterona, es un prometabólico, de uso veterinario. En el caso de bovinos, porcinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos: se utiliza en retrasos en el crecimiento, estados de debilidad en recién nacidos, durante la convalecencia de enfermedades infecciosas y parasitarias (aftosa, anaplasmosis, babesiosis, verminosis pulmonar, distomatosis, estomatitis vesicular, neumonía, trypanosomosis.), después de un parto difícil, osteoporosis, para combatir la descalcificación en las vacas lecheras de producción elevada, en el curso y después de tratamientos de larga duración con corticoesteroides, anorexia y problemas nutricionales, disminución de la fertilidad o agotamiento sexual en machos y hembras, atrofias y distrofias musculares.

COMPOSICIÓN

Nandronola decanoato..... 25 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Nandronola es un prometabólico que ejerce un potente efecto anabolizante de larga duración (2-3 semanas), es decir, estimula los procesos anabólicos del organismo.

Asimismo, corrige las perturbaciones catabólicas, tanto infecciosas como parasitarias, perturbaciones, que se traducen en una degradación de los tejidos óseos, musculares y sanguíneos, permitiendo la ganancia de peso y recuperación de los animales. Produce retención de nitrógeno en los tejidos (mantiene el balance nitrogenado positivo) y al mismo tiempo promueve la fijación del calcio y fósforo. Además ejerce un efecto tónico que favorece el apetito. Actúa favoreciendo la síntesis de las proteínas celulares e inhibiendo la destrucción de los ácidos aminados (factores de ahorro de las proteínas) por lo que influye favorablemente en el crecimiento de animales jóvenes, en la conversión alimentaria y en el estado físico de los animales debilitados.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, caninos y felinos domésticos (gatos).

Bovinos porcinos, equinos, ovinos y caprinos:

- Engorde.
- Retrasos en el crecimiento.
- Estados de debilidad en recién nacidos.
- Durante la convalecencia de enfermedades infecciosas y parasitarias (aftosa, anaplasmosis, babesiosis, verminosis pulmonar, distomatosis, estomatitis vesicular, neumonía, trypanosomosis).
- Después de un parto difícil.
- Osteoporosis.
- Para combatir la descalcificación en las vacas lecheras de producción elevada.
- En el curso y después de tratamientos de larga duración con corticoesteroides.
- Anorexia y problemas nutricionales.
- Disminución de la fertilidad o agotamiento sexual en machos y hembras.
- Atrofias y distrofias musculares.

Caninos y Felinos domésticos (gatos):

- Uremia.
- Artritis deformante.
- Durante y después del tratamientos de larga duración con corticosteroides.
- Para combatir la descalcificación.
- Síntomas de senilidad.
- En casos de fracturas.
- Después de heridas graves y de intervenciones quirúrgicas.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular o subcutánea: 1 mg/kg. p.v. (1 ml de NANDROL/ 25 kg. p.v.) con un máximo por animal de:

Perros de menos de 10 kg: 12.5 mg (0.5 ml / animal)

Perros de 10 kg. o más: 25 mg (1 ml / animal)

Gatos: 12,5 mg (0,5 ml /animal).

Equinos y bovinos adultos:	200 mg (8 ml / animal)
Potros y terneros:	100 mg (4 ml / animal)
Cerdos, ovejas y cabras:	50 mg (2 ml / animal)

EFECTOS SECUNDARIOS

En tratamientos muy prolongados o a dosis altas puede originar síntomas de actividad andrógena.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en hembras preñadas, ya que se puede causar virilización del feto.
- × En caballos de competición, usar de acuerdo con las regulaciones locales al respecto.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, En caso de sobredosificación pueden darse casos de actividad androgénica.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días. **Leche:** no usar

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Usar guantes para evitar accidentes durante la administración.
- No usar en animales en etapas de preñez o próximos a la monta o apareamiento.
- No usar en animales con cáncer de próstata o cáncer mamario.
- No usar en animales menores de 3 meses.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 10 y 50 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N076917

