



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

NUTRIL (VACAS LECHERAS)

MINERAL Y VITAMINAS

**Emulsión coloidal inyectable
Agitar antes de usar**



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

Nutril (Vacas Lecheras), es una emulsión coloidal inyectable cuya fórmula es un complejo de vitaminas y minerales, especialmente indicado para la zona donde el pasto tiene deficiencias de macro-elementos minerales (calcio, fósforo, magnesio) y oligo-elementos minerales (cobre, cobalto, yodo, selenito de sodio), utilizado para el tratamiento preventivo de la paresia puerperal en vacas preñadas y vacas en lactación.

COMPOSICIÓN

Vitamina A Palmitato.....	500.000 UI
Vitamina D2.....	100.000 UI
Vitamina B12.....	500 mcg
Calcio hipofosfito.....	2 g
Cobre cloruro.....	100 mg
Cobalto cloruro.....	100 mg
Magnesio cloruro.....	100 mg
Yoduro de potasio.....	300 mg
Selenito de sodio.....	150 mg
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La formulación aporta vitaminas y minerales esenciales que actúan como cofactores metabólicos, antioxidantes y reguladores del metabolismo mineral y hormonal en vacas lecheras. La vitamina A favorece la integridad epitelial, la inmunidad y la función reproductiva; la vitamina D2 regula la absorción y utilización de calcio y fósforo; y la vitamina B12 participa en el metabolismo energético y la hematopoyesis. El calcio hipofosfito contribuye al soporte mineral y neuromuscular; el cobre, cobalto y magnesio intervienen como cofactores enzimáticos y en el equilibrio metabólico; el yoduro de potasio aporta yodo para la síntesis de hormonas tiroideas; y el selenito de sodio actúa como fuente de selenio con función antioxidante, protegiendo tejidos y apoyando la inmunidad y la reproducción.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



- ☐ Zonas con pastos deficientes en macro-elementos minerales (Calcio, Fósforo, Magnesio) y oligo-elementos minerales (Cobre, Cobalto, Yodo, Selenio).
- ☐ Tratamiento preventivo de la paresia puerperal en vacas preñadas y vacas en lactación.
- ☐ Tratamiento preventivo de la retención placentaria.
- ☐ Para acortar el periodo de anestro.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar por vía intramuscular.

Vacas lecheras: 1 ml por 30 Kg p.v, cada 90 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

Todos los componentes son naturales y carecen prácticamente de toxicidad. La administración de dosis excesivas, generalmente no da lugar a síntomas de toxicidad, ya que normalmente los procesos biológicos del organismo son capaces de regular la absorción, de facilitar la difusión y de asegurar la disminución de las cantidades excesivas que se hayan podido administrar.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ Agítase el frasco antes de administrar el producto.
- ✦ Inyectar vía intramuscular.
- ✦ Utilizar equipo estéril de inyección y desinfectar la zona de aplicación.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana

N° de registro: INSAI2041PN33N072165

N° de registro Nicaragua: MV-7466

