



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

NUTRIL

AMINOÁCIDO – VITAMÍNICO – MINERAL

**Suspensión inyectable
Agitar antes de usar**

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

NUTRIL es un producto de uso veterinario, cuya presentación farmacéutica es en suspensión inyectable, tiene una composición con complejos de vitaminas, aminoácidos, minerales y pródigo-anabolizante especialmente indicado en la prevención y tratamiento de las deficiencias orgánicas de bovinos, ovinos, caprinos y equinos.

COMPOSICIÓN

Vitamina A (Palmitato).....	500.000 UI
Vitamina D2.....	2.000.000 UI
Vitamina E.....	500 mg
Vitamina B6 (clorhidrato).....	800 mg
Vitamina B12.....	5 mg
Sulfato de cobre.....	2 mg
Sulfato de cobalto.....	13 mg
Hipofosfito de magnesio.....	210 mg
Gluconato de calcio.....	1.500 mg
Cloruro de sodio.....	42 mg
Yoduro de potasio.....	15 mg
Selenito sódico.....	100 mg
L-Lisina clorhidrato.....	1000 mg
L-Glicina.....	500 mg
DL- Metionina.....	400 mg
L- Arginina clorhidrato.....	400 mg
L- Treonina.....	25 mg
Nandrolona Decanoato.....	200 mg
L-Valina.....	200 mg
L- Triptófano.....	25 mg
L- Leucina.....	210 mg
L- Histidina clorhidrato.....	210 mg
Gluconato de zinc.....	10 mg
Hierro citrato (amoniacal)	400 mg
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Las vitaminas, aminoácidos, minerales y el pródigo-anabólico actúan como reguladores y constructores esenciales en el organismo, participando en procesos metabólicos clave (como el metabolismo de calcio y fósforo, la síntesis de proteínas y la formación de hemoglobina), la construcción y reparación de tejidos, y la modulación de funciones fisiológicas específicas (como la visión, la función muscular y la respuesta inmune).

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos, ovinos, caprinos y equinos:**

- ☐ Como complemento nutricional en la desparasitación interna, tratamientos anti infecciosos y vacunaciones. Factor de engorde y de crecimiento.
- ☐ Reconstituyente, recuperación de animales debilitados, raquitismo, falta de apetito y anemia.
- ☐ Convalecencia y debilidad subsiguiente a enfermedades infecciosas o infestaciones parasitarias.
- ☐ Situaciones de estrés producidas por destete precoz, descorne, castraciones y cambio de ambiente.
- ☐ Recuperación de vacas viejas en pobre estado de carne como consecuencia de lactancias muy intensas o trastornos nutricionales.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular profundo

Beceros y potros: 5 mL / animal.

Bovinos y equinos adultos: 10 mL/ animal.

Corderos y cabritos: 2 a 3 mL / animal.

Ovinos y caprinos adultos: 5 a 6 mL / animal.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en hembras en gestación o lactancia.
- × No administrar en animales con tumores malignos (carcinomas de la glándula mamaria o próstata).

SOBREDOSIFICACIÓN

La administración de dosis excesivas, generalmente no da lugar a síntomas de toxicidad, ya que normalmente los procesos biológicos del organismo son capaces de regular la absorción, de facilitar la difusión y de asegurar la disminución de las cantidades excesivas que se hayan podido administrar

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días

Leche: No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ Inyectar vía intramuscular profunda.
- ✦ Utilizar equipo estéril de inyección y desinfectar la zona de aplicación para disminuir los riesgos de infecciones.
- ✦ Agitar antes de usar.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072141
N° de registro Nicaragua: MV-10519

