



**LABORATORIOS  
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

## **FICHA TÉCNICA**

# **ODINEX**

**ANTIBACTERIANO – ANTIPARASITARIO  
ANTIMICÓTICO**

**Solución ótica**



**USO VETERINARIO**

## DESCRIPCIÓN



**ODINEX** Solución para aplicación tópica a base de una asociación de Neomicina sulfato (antibacteriano), Fipronil (ectoparasitocida) y Dexametasona base (antiinflamatorio) y un anestésico local (lidocaína). Está indicada para el tratamiento de infecciones únicas o mixtas del oído de origen bacteriano y parasitario en PERROS y GATOS.

## COMPOSICIÓN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Neomicina sulfato.....     | 7,2 mg  |
| Fipronil.....              | 0,05 mg |
| Dexametasona base.....     | 1 mg    |
| Lidocaina clorhidrato..... | 5 mg    |
| Ácido undecilénico.....    | 10 mg   |
| Excipientes c.s.p.....     | 1 mL    |

## MECANISMO DE ACCIÓN:

La neomicina sulfato actúa evitando la proliferación y eliminando a bacterias como la pseudomona, causa común de las otitis. En el **ODINEX** el uso de la dexametasona como antiinflamatorio, produce efectos vasoconstrictores, reduciendo la secreción e inflamación de los tejidos e induciendo reducción de la secreción de glándulas sebáceas y por ende disminución del dolor y prurito.

El hecho de encontrarse entre los antiinflamatorios que se consideran suaves permite su uso en forma prolongada sin efectos colaterales generales. Posee fipronil que es un acaricida, y un anestésico local que elimina el dolor.

Por último **ODINEX** contiene como excipiente propilenglicol farmacéutico que es un lubricante y suavizante de la piel, que logra una dispersión homogénea de los principios activos a lo largo de todo el conducto auditivo externo, taponando en forma natural los poros y de esa manera favoreciendo la muerte de los ácaros en las otitis causadas por los mismos.

Es importante saber que el 80 al 85 % de las otitis del conducto auditivo externo (otitis externas) se tratan y curan con terapia tópica solamente.

## ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



**Caninos y felinos domésticos:** tratamiento tópico de otitis externas: eczematosas, infecciosas, parasitarias (por acaros) o micóticas.

## ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administración por vía ótica.



Instilar 5-10 gotas en el conducto ótico/ 2 veces al día, durante 7 a 10 días.

En la otitis parasitaria por *Otodectes cynotis*, tratar 3 días por semana, durante 3 semanas.

Efectuar un ligero masaje en la base de la oreja a fin de que el producto penetre bien en el oído y contacte con las paredes lesionadas.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

## CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

## SOBREDOSIFICACIÓN

Al tratarse de una especialidad farmacológica de aplicación tópica, no existe riesgo de intoxicación por sobredosificación.

## TIEMPO DE RETIRO

No precisa

## PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Efectuar un ligero masaje en la base de la oreja a fin de que el producto penetre bien en el oído y contacte con las paredes lesionadas.

## PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

## PRESENTACIÓN

Contenido neto: 15 mL.

**Venta bajo prescripción del médico veterinario**

**Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana**  
**N° de registro: INSAI2041PN33N076769**



Laboratorios  
REVEEX DE VENEZUELA, C.A.  
RIF: J-07524745-0