



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

OSMOLAR LIQUIDO

SUEROTERAPIA

Solución oral

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



OSMOLAR LIQUIDO es una solución oral empleada como sueroterapia líquida que tiene una extraordinaria eficacia cuando se administra oportunamente, dada la labilidad del equilibrio hídrico, tan acusada sobre todo en los animales de corta edad, siendo a la vez la vía más fisiológica.

COMPOSICIÓN

Glucosa	10 g
Cloruros.....	198 mEq
Sodio.....	170 mEq
Potasio.....	10 mEq
Calcio.....	19 mEq
Ac. Láctico	20 mEq
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La sueroterapia oral tiene una extraordinaria eficacia cuando se emplea oportunamente, dada la labilidad del equilibrio hídrico, tan acusada sobre todo en los animales de corta edad, siendo a la vez la vía más fisiológica.

A la eficacia del suero Ringer y el lactato sódico se suman las de la energética de la glucosa, permitiendo reparar las pérdidas de líquidos orgánicos y extracelulares, restableciendo la presión osmótica indispensable para la retención de agua.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves.

- Deshidratación por diarreas de origen bacteriano, viral o nutricional. Deshidratación de origen infeccioso (hipertermia) o parasitario. Deshidratación por exceso de calor.
- Deshidratación por vómitos e intoxicaciones.
- Stress (transporte, calor, cambios alojamiento, vacunaciones, aglomeraciones, destete).
- Estados de shock (grandes pérdidas de líquidos y electrolitos).



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Se administra por vía oral previamente disuelto en el agua de bebida a las dosis de:

Aves: 1 -2 ml / litro agua/ día.

Lechones, corderos y cabritos: 25-50 ml /animal /día.

Terneros y potros: 100-200 ml /animal /día.

Porcinos: 50-100 ml/animal/ día.

La duración del tratamiento tiene que adaptarse a cada caso en particular y teniendo en cuenta los problemas observados. Puede administrarse de forma simultánea con antibióticos o quimioterapicos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En algunos casos pueden presentarse retención de líquidos.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en animales con procesos edematosos de origen circulatorio o infeccioso.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, no obstante, de presentarse problemas de sobredosificación, da lugar a procesos diarreicos, convulsiones y taquicardia. El tratamiento debe establecerse mediante el empleo de diuréticos, corticoides, gran cantidad de agua y analépticos.

TIEMPO DE RETIRO

No preciosa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

No administrar junto con ácido acetil salicílico, procaína, tetraciclina clorhidrato, estreptomicina sulfato y vancomycina.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L y 3,785 L

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N073317

