



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

TETRALONG 30 L.A.

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

Solución inyectable de larga duración



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



TETRALONG 30 L.A. es un antibiótico de amplio espectro y está indicado en la prevención y tratamientos prolongados contra infecciones por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina como son los estafilococos, estreptococos, pasteurelas, salmonelas, clostridios, bacterias coliformes, corinebacterias y erisipelas. También es efectiva contra micoplasmas, rickettsias y protozoos. Su forma farmacéutica facilita su administración y mantiene sus niveles terapéuticos durante un periodo prolongado, reduciendo el numero de tratamientos, estrés y recaídas en los animales.

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina (dihidrato).....	30 g
Excipiente c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro que combate diversas bacterias, tanto grampositivas como gramnegativas, incluyendo espiroquetas. Su acción principal es detener el crecimiento de las bacterias al interferir con su proceso de producción de proteínas, esencial para su supervivencia. En particular, evita la unión de ciertos componentes esenciales del ARN de transferencia a los ribosomas, lo que bloquea la síntesis proteica. Este antibiótico tiene la ventaja de afectar exclusivamente a bacterias, sin dañar las células, lo que hace que sea un tratamiento selectivo y seguro.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos y porcinos.**

Bovinos: neumonía, pasteurelosis, enfermedad del transporte, anaplasmosis, leptospirosis, clamidiosis, panadizo y terapia de soporte en la metritis y mastitis.

Porcinos: neumonía, pleuroneumonía, rinitis atrófica, leptospirosis, clamidiosis, brucelosis, infecciones gastrointestinales e infecciones bacterianas secundarias asociadas a infecciones víricas.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular profunda.

- ✍ Dosis normal: 1 ml de TETRALONG 30 L.A/15 kg p.v., para obtener una actividad antibacteriana durante 3- 4 días.
- ✍ Dosis alta: 1 ml de TETRALONG 30 L.A/10 kg p.v., para obtener una actividad antibacteriana durante 6-7 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ☐ Posible sobreinfección de la flora intestinal por predominio de gérmenes resistentes, especialmente hongos.
- ☐ Se han observado casos de hipersensibilidad cutánea o casos de anafilaxis, en dichos casos suspender el medicamento y administrar epinefrina, corticoides y antihistamínicos según corresponda.
- ☐ La inyección intramuscular puede ser dolorosa produciendo inflamación y necrosis en el punto de inoculación.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con antecedentes de sensibilidad a las tetraciclinas.
- × No administrar a animales con alteraciones hepáticas o renales.
- × No administrar a équidos, produce enterocolitis disenteriforme mortal.

SOBREDOSIFICACIÓN

Las tetraciclinas presentan una toxicidad relativamente baja, pudiendo aparecer trastornos gastrointestinales.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 22 días.

Leche: 3 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

No se han descrito.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50 y 100 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario
Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro INSAI2041PN33N076953

