



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

PARACETAMOL 30% LÍQUIDO

ANALGESICO - ANTIPIRETICO

**Solución oral
para administrar en agua de bebida**



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



PARACETAMOL 30% LIQUIDO es un producto que posee actividades analgésicas y antipiréticas, es eficaz para el tratamiento de la fiebre como la originada por infecciones virales, y reacciones febriles post vacunación, así como la reducción del estrés por manejo de los animales.

Mejora la condición de los animales enfermos al reducir los efectos sintomáticos provocados por el dolor y fiebre, tales como anorexia, debilidad, apatía, ayudando a la recuperación del apetito en los animales y por tanto, reincorporándolos rápidamente a la línea de producción normal.

PARACETAMOL 30% LIQUIDO es útil también para el control del dolor leve o moderado. Es recomendable su uso en conjunto con los tratamientos que llevan antibióticos, ya que ayuda a la eficacia de estos, mejorando los resultados. En porcinos, aves y rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos).

COMPOSICIÓN

Paracetamol.....	0,3 g
Excipientes c.s.p.....	1 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

El paracetamol ejerce su efecto antipirético al inhibir de forma débil y reversible la actividad de la ciclooxigenasa (COX-1 y COX-3) en el hipotálamo, reduciendo la síntesis de prostaglandinas responsables de elevar la temperatura corporal. Su acción analgésica es central, modulando vías serotoninérgicas y cannabinoides, lo que disminuye la transmisión y percepción del dolor sin generar un efecto antiinflamatorio periférico significativo.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Porcinos, aves y rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos)

Es útil en:

- Dolores leves o moderados.
- Fiebre por infección viral o post vacunación.
- Ayuda a reducir el estrés por manejo de los animales.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral, en el agua de bebida.

Bovinos, Ovinos y Caprinos: La dosis recomendada es de 1 ml de PARACETAMOL 30% LIQUIDO/kg p.v. día por litro de agua de bebida (equivalente a 30 mg de PARACETAMOL 30%/ kg p.v./día).

Porcinos: La dosis recomendada es de 1 ml de PARACETAMOL 30% LIQUIDO/10 kg p.v. día por litro de agua de bebida (equivalente a 30 mg de PARACETAMOL 30%/ kg p.v./día).

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta. El consumo diario de agua depende de la situación clínica de los animales.

Según la dosis recomendada, el número y el peso de los animales que deben recibir tratamiento, se debe calcular la dosis diaria exacta del medicamento según la fórmula siguiente:

0,1 mL de medicamento veterinario/kg peso vivo/día $\times$ Peso vivo medio de los animales individuales (kg) $\times$ Número de animales tratados	= ml del medicamento veterinario por litro de agua de bebida.
Consumo de agua total (litros) de los animales a tratar en el día anterior.	

Aun cuando la variabilidad puede ser grande, nos moveremos en valores de entre 0,5- 1 mL de PARACETAMOL 30% LIQUIDO / 10 kg p.v./vía oral en el agua de bebida, que son exclusivamente orientativos. La solución debe prepararse de nuevo cada 24 horas. No debería estar disponible ninguna otra fuente de agua de bebida durante el período de medicación.

En aves: administrar una dosis entre 0,05-0,1 mL de PARACETAMOL 30% LIQUIDO/ kg p.v. día. (equivale a una dosis de 15- 30 mg de PARACETAMOL 30 % LIQUIDO/ kg p.v./día).

EFFECTOS SECUNDARIOS

En algunos animales puede observarse un incremento de los niveles hemáticos de urea, y disminución de los niveles de creatinina.

Las reacciones secundarias y adversas que pueden llegar a presentarse son las siguientes: somnolencia, nerviosismo, irritabilidad, mareo, náusea, vómito, erupción cutánea, taquicardia, hipertensión arterial, cefalea, dolor abdominal.

CONTRAINDICACIONES

- $\times$ No administrar a animales alérgicos al Paracetamol.
- $\times$ No administrar a animales con insuficiencia hepática y/o renal.
- $\times$ No exceder la dosis recomendada. En los estudios efectuados en animales de laboratorio no se han identificado efectos teratógenos o fototóxicos a la dosis terapéutica. La seguridad de este medicamento no está establecida durante la gestación y la lactancia. Usar según una evaluación del beneficio / riesgo realizada por el veterinario responsable.

SOBREDOSIFICACIÓN

- ☐ No fueron detectados efectos indeseables en los cerdos al triple de la dosificación ni al doble del tiempo de administración recomendados.
- ☐ Dosis excesivas pueden causar hepatotoxicidad.
- ☐ Tratamiento en caso de sobredosificación: administrar N-acetilcisteína como antídoto.

TIEMPO DE RETIRO

Porcino Carne: 1 día.

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Aves: Carne y despojos: 0 días;
Huevos: 0 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ La solución debe prepararse de nuevo cada 24 horas. No debería estar disponible ninguna otra fuente de agua de bebida durante el período de medicación.
- ✍ Recomendaciones para la disolución:

La máxima solubilidad del medicamento veterinario en agua (dura/blanda) a (5°C/20°C) es de 100 ml/L. En primer lugar añada la cantidad necesaria de agua en el contenedor. Después añada el medicamento veterinario mientras agita la solución. Cuando utilice un dosificador no exceda la solubilidad máxima bajo las condiciones indicadas. Ajuste el caudal de la bomba dosificador según la concentración y la ingesta de agua de los animales a tratar.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 L, 5 L y 1 GALÓN.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana

N° de registro: INSAI2041PN33N057172

