



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

PENIVEEX COMPLEX L.A

ANTIBACTERIANO

Suspensión Inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



PENIVEEX COMPLEX L.A. Es una combinación de antibióticos que contiene dos penicilinas (rápida y mediana acción y un aminoglucósido (Dihidroestreptomicina), adicionado con un potente antihistaminico (Clorfeniramina maleato) que actúan en forma rápida y efectiva, en procesos alergicos. Se encuentra en forma de suspensión inyectable. Está indicado en infecciones respiratorias, genitourinarias, septicémicas, y en enfermedades tales como: actinomicosis, leptospirosis, listeriosis, pasteurelosis, pododermatitis necrótica, pielonefritis contagiosa bovina, en síndrome mastitis, metritis, agalactia (MMA) de la cerda y en procesos infecciosos en que los agentes causales sean sensibles a los antibióticos de la fórmula.

COMPOSICIÓN

Penicilina procaína.....	15.000.000 UI
Penicilina benzatina.....	5.000.000 UI
Dihidroestreptomicina sulfato.....	20 g
Clorfeniramina maleato.....	1 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Bencilpenicilina procaína y benzatina: Son antibióticos que eliminan bacterias al impedir que formen su pared celular, lo que las debilita y destruye. La procaína ayuda a reducir el dolor de la inyección y la benzatina permite que el medicamento actúe por más tiempo.

Dihidroestreptomicina: Otro antibiótico que ataca las bacterias bloqueando su capacidad de producir proteínas esenciales para su supervivencia.

Clorfeniramina maleato: Es un antihistamínico que reduce la inflamación y la reacción alérgica, ayudando a aliviar síntomas como picazón y enrojecimiento.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.**

Bovinos: infecciones respiratorias, infecciones genitourinarias, septicemias, metritis, actinomicosis, carbunco bacteriano, heridas infectadas, abscesos cutáneos, listeriosis, onfalitis.

Porcinos: artritis, síndrome MMA, neumonía, bronconeumonía, septicemia, mal rojo, metritis, heridas infectadas.

Ovinos y caprinos: neumonía, pasteurelisis, infecciones genitourinarias, enterotoxemia, mastitis, metritis, carbunco bacteriano, heridas infectadas, abscesos.

Equinos: neumonía, carbunco bacteriano, metritis, abscesos cutáneos.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular.

7,5 mL/ 100 kg p.v. Aplicar una o dos dosis con un intervalo de 48 horas.

EFECTOS SECUNDARIOS

- ▶ Reacciones alérgicas o anafilácticas: se dan en animales hipersensibles, algunas veces son graves, durando generalmente entre 2 y 4 horas. Los bóvidos viejos suelen estar más predispuestos, y sus síntomas son salivación, temblores, vómitos, respiración dificultosa y edema cutáneo en algunas zonas del cuerpo.
- ▶ En casos graves, se suprimirá la administración y se aplicará epinefrina y/o corticoides inmediatamente.
- ▶ En lechones y cerdos de engorde ocasionalmente, y en situaciones de estrés, se puede dar fiebre transitoria, vómitos, incoordinación, temblores, apatía.
- ▶ En caballos de capa blanca y piel fina pueden observarse placas cutáneas y cardenales en el punto de aplicación, con edema local y dolor muscular.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con:

- × Hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos.
- × Insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o con lesiones cocleovesibulares.
- × Edad inferior a un mes.
- × Conejos, cobayas y hámsters.

SOBREDOSIFICACIÓN

- ☀ Toxicidad curariforme por intoxicación accidental: los síntomas son inquietud, dificultad respiratoria, pérdida de conciencia y en ocasiones, muerte por fallo respiratorio y depresión vasomotora. En estos casos, se suprimirá la administración del medicamento y se aplicará respiración artificial mantenida, así como antihistamínicos y sales de calcio por vía IV lenta.
- ☀ Ototoxicidad (fundamentalmente en gatos): por ser una especie particularmente sensible a la dihidroestreptomicina, sobretodo en tratamientos prolongados. Los síntomas en ellos son pérdida de equilibrio y audición, ataxia y pérdida de nistagmo rotatorio progresivo. En estos casos, se suspenderá la administración del medicamento. No obstante, la recuperación es lenta y gradual y en algunos casos el daño es permanente.
- ☀ Nefrotoxicidad: normalmente se observan albuminuria, cilindruria, enzimuria y anuria.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 30 días antes del sacrificio.

Leche: 3 días antes de destinar la leche a consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Mantener condiciones de asepsia durante la administración del preparado, desinfectando previamente la zona de inyección con alcohol.
- No administrar por vía intravenosa o en las proximidades de un nervio importante.
- Administrar con precaución en animales con historial de alergias.
- Vigilar la función renal durante el tratamiento, sobre todo en animales jóvenes.
- Evitar tratamientos prolongados

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 10, 20, 100 y 250 ml

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072143

