



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

PENIVEEX ESTREPTO 200

ANTIBACTERIANO

Suspensión Inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



PENIVEEX ESTREPTO 200 es una suspensión inyectable, antibiótica de amplio espectro y larga acción a base de Bencilpenicilina y Dihidroestreptomicina. Esta asociación ofrece un efecto sinérgico, que amplifica el espectro de acción y la potencia de ambos antibióticos dando una acción prolongada para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a estos activos, tales como los del sistema respiratorio, genitourinario entre otras.

COMPOSICIÓN

Bencilpenicilina procaína 200 mg
Dihidroestreptomicina (sulfato).....200 mg

MECANISMO DE ACCIÓN:

Bencilpenicilina procaína es un antibiótico funciona contra muchos tipos de bacterias, incluyendo estreptococos, neumococos, estafilococos no productores de betalactamasa, *Corynebacterium diphtheriae*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Actinomyces spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae* y *Listeria monocytogenes*. También muestra actividad contra algunas bacterias Gram negativas, como *Leptospira spp.* y *Treponema pallidum*.

La dihidroestreptomicina es un antibiótico aminoglucósido se utiliza principalmente contra bacterias Gram negativas, incluyendo *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Yersinia spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Brucella spp.* y *Campylobacter fetus*. También muestra actividad frente a algunas bacterias Gram positivas, como *Actinomyces bovis* y *Mycobacterium spp*

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA



Vía intramuscular.

Bovinos, ovinos, porcinos y equinos: 0,3-0,6 ml de PENIVEEX ESTREPTO 200 por cada 10 kg de peso vivo.

Caninos y felinos domésticos: 0,5-1 ml de PENIVEEX ESTREPTO 200 por cada 10 kg de peso vivo.

Continuar el tratamiento hasta 1 o 2 días después de la remisión de los síntomas.



ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

Bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos domésticos.

Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias y/o secundarias a infecciones víricas, causadas por gérmenes sensibles a la asociación, tales como:

Bovinos y ovinos: abscesos cutáneos, actinomicosis, afecciones podales, artritis, carbunco bacteriano, leptospirosis, mamitis, metritis, neumonía y bronconeumonía.

Porcinos: artritis, aborto (por brucillas, leptospiras y otros gérmenes sensibles), leptospirosis, mal rojo, neumonía y bronconeumonía, síndrome MMA.

Equinos: metritis, neumonía, bronconeumonía y adenitis equina (papera).

Caninos y felinos domésticos: artritis, infecciones génito-urinarias, neumonía, traqueobronquitis y peritonitis.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Reacciones alérgicas o anafilácticas se dan en animales hipersensibles, y algunas veces son graves, durando generalmente entre 2 y 4 horas. Los perros y bovinos viejos suelen estar más predispuestos, y sus síntomas son salivación, temblores, vómitos, respiración dificultosa y edema cutáneo, en algunas zonas del cuerpo. En casos graves, se suprimirá la administración, y se aplicarán epinefrina y/o corticoides inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en:

- × Animales con hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos.
- × Animales con insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o con lesiones cocleovestibulares.
- × Animales con edad inferior a un mes.
- × Conejos, cobayas y hámster.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, no obstante, de presentarse problemas de sobredosificación por el uso prolongado del medicamento, puede darse crecimiento de microorganismos no susceptibles (hongos y estafilococos productores de penicilinas).

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 30 días. **Leche:** 3 días.

Si se utiliza en equinos, la carne no puede ser destinada al consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ Mantener condiciones de asepsia durante la administración del preparado, desinfectando previamente la zona de inyección con alcohol.
- ✦ No administrar por vía subcutánea, intravenosa o en las proximidades de un nervio importante.
- ✦ Administrar con precaución en animales con historial de alergias.
- ✦ Vigilar la función renal durante el tratamiento, sobre todo en animales jóvenes.
- ✦ Evitar tratamientos prolongados, sobre todo en carnívoros.
- ✦ Continuar el tratamiento hasta 1 o 2 días después de la remisión de los síntomas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario
Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0520915

