



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

POMADA ANTIBIÓTICA OCULAR

ANTIBACTERIANO

Pomada oftálmica



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



POMADA ANTIBIOTICA OCULAR, es una especialidad farmacológica en cuya composición posee dos antibacterianos: clortetraciclina y neomicina activos frente a una amplia gama de bacterias patógenas encontradas en infecciones oculares. Los organismos susceptibles incluyen bacterias grampositivas como *Staphylococcus spp*, incluyendo *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp*, incluyendo *S. pyogenes*, y bacterias gramnegativas como *Enterobacter spp*, *Escherichia spp*, *Haemophilus spp*, *Klebsiella spp*, *Proteus spp*, *Pseudomonas spp*, incluyendo *Pseudomonas aeruginosa*. Además en su fórmula posee un antiinflamatorio de origen esteroideo como lo es la prednisolona y un anestésico local la lidocaína que favorece la disminución del dolor producto de procesos inflamatorio e infeccioso de origen ocular.

COMPOSICIÓN

Clortetraciclina (clorhidrato)	5 mg
Neomicina (sulfato).....	8 mg
Prednisolona (base).....	2 mg
Lidocaína (clorhidrato).....	5 mg
Excipientes c.s.p.....	1 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

Clortetraciclina: Es un antibiótico que impide que las bacterias produzcan proteínas esenciales para su crecimiento, evitando así la infección.

Neomicina sulfato: Otro antibiótico que actúa destruyendo las bacterias al alterar su membrana celular, lo que ayuda a combatir infecciones oculares.

Prednisolona base: Es un corticoide que reduce la inflamación y la irritación en los ojos, aliviando el enrojecimiento y la hinchazón.

Lidocaína clorhidrato: Es un anestésico local que bloquea la sensación de dolor en la zona aplicada, proporcionando alivio inmediato.

Esta combinación ayuda a tratar infecciones oculares, reducir la inflamación y aliviar el malestar en los ojos

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Perros, gatos y gallos de pelea: tratamiento tópico de infecciones del ojo externo y sus anexos, especialmente las causadas por gérmenes sensibles a la clortetraciclina: conjuntivitis, queratitis, blefaritis e iritis.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administración por vía oftálmica, en el saco de la conjuntiva o sobre el párpado inferior.

1. Antes de aplicar la pomada, quitar las costras del ojo, si las hubiese, reblandeciéndolas con agua tibia.
2. Es conveniente, que la aplicación de la pomada se realice con pulcritud, evitando cualquier contacto con la cánula del tubo.
3. Aplicar una cantidad discrecional de pomada en el saco conjuntival o sobre el párpado inferior del ojo afectado, 2 o 3 veces al día.
4. La duración del tratamiento será a criterio del médico veterinario.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Pueden producirse reacciones alérgicas que requieren la suspensión del tratamiento.
- Puede producirse crecimiento de microorganismos resistentes, en particular hongos, en cuyo caso hay que suspender la administración y aplicar el tratamiento adecuado.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, no obstante, de presentarse problemas de sobredosificación, realizar un tratamiento sintomático. Los síntomas de intoxicación consisten en temblor, convulsiones y coma.

TIEMPO DE RETIRO

No procede

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Tapar el tubo después de cada aplicación.
- ✍ Evitar el contacto de la boca del tubo con la zona lesionada.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 10 g

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro INSAI2041PN33N075554

