



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

SARNIVEEX 12,5%

SARNICIDA - GARRAPATICIDA

Solución emulsionable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

SARNIVEEX 12,5% es un ectoparasitocida organonitrogenado, muy utilizado, con amplio espectro de aplicaciones, con baja toxicidad e insignificante residualidad plaguicida. Empleado en el tratamiento preventivo y curativo de infestaciones por garrapatas y ácaros en caninos. Es un acaricida no sistémico con acción de contacto.

COMPOSICIÓN

Amitraz 12,5 g
Excipiente c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El amitraz se comporta como un antagonista octopaminérgico. La octopamina es una amina adrenérgica semejante a noradrenalina que en los invertebrados actúa como una neurohormona, neurotransmisor o modulador de la actividad neuromuscular. La acción letal del amitraz es el resultado de una estimulación continua al ocupar receptores octopaminérgicos, provocando trastornos locomotores y la muerte del parásito.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Caninos:

- ✓ Tratamiento preventivo y curativo de garrapatas (*Rhipicephalus sanguíneos*) y sarna (*Demodex canis* y *Sarcoptes Scabiei* - var. *canis*).

MODO DE APLICACIÓN

Bañar el perro con jabón, aclarar con abundante agua y secarlo bien.

Diluir la cantidad del producto a usar de acuerdo al tratamiento a aplicar y agitar para obtener una mezcla homogénea. Mojar bien y completamente al perro, dejarlo secar al aire.

La dilución debe prepararse inmediatamente antes de usarla, pues el producto diluido se degrada aproximadamente en 48 horas.

Especie	Dilución Recomendada	Dosis por 10L de agua	Modo de Aplicación	Observaciones
Perros	1:500 – 1:600	16,7 – 20 mL	Esponjado o baño (sin inmersión)	Evitar que se laman. No aplicar en cachorros menores de 3 meses.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Somnolencia, letargia, depresión y anorexia. Estos efectos se evidencian en alrededor del 30 % de los pacientes hasta 36 horas después del tratamiento. Pueden darse reacciones cutáneas locales a continuación del contacto dérmico (irritación, eritema, prurito) que se resuelve al cesar el contacto.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a hembras preñadas o en lactación. No administrar a cachorros menores de 45 días. No administrar a animales diabéticos. No administrar a gatos. No usar en Chihuahua, Fox terrier o Poodle enano. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa. No aplicar en perros con pioderma profundo, solo aplicar cuando mejoren las lesiones

SOBREDOSIFICACIÓN

Síntomas de intoxicación en animales: ataxia; flacidez, debilidad muscular; depresión, pulso débil, apenas palpable; hipotermia; poliuria ocasional. En general, el pronóstico es bueno, con recuperación dentro de los 25 días.

En casos de ingestión masiva, los primeros signos clínicos incluyen: vómitos; sialorrea; midriasis (ocasional); hipertermia y temblores. Aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación por ingestión provocar el vómito.

TIEMPO DE RETIRO

No procede.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Evitar el contacto con ojos, piel y mucosas.

Debe utilizarse equipo de protección: guantes, mascarilla y ropa apropiada.

Lavarse las manos y piel expuesta con agua y jabón tras su uso.
No comer, beber ni fumar durante su manipulación.
Mantener alejado de los alimentos.
Aplicar en zonas bien ventiladas, preferiblemente al aire libre y no inhalar los vapores.
Destruir los envases de forma segura. No reutilizar los envases vacíos.
No perforar el envase ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50 y 100 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN01II056488

