



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

SEPTIBRON FORTE TF

ANTIBACTERIANO

Solución inyectable

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SEPTIBRON FORTE TF, antibacteriano de uso sistémico, en solución inyectable estéril, presentado como un líquido claro y homogéneo, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y sistémicas, causadas por bacterias sensibles a Tylosina y Florfenicol; destinado a la administración intramuscular profunda en diversas especies animales.

COMPOSICIÓN

Florfenicol.....	150 mg
Tilosina (tartrato).....	100 mg
Excipientes c.s.p	1 ml

MODO DE ACCIÓN

La combinación de Tylosina y Florfenicol en SEPTIBRON FORTE TF asegura una acción antimicrobiana ampliada, siendo eficaz contra infecciones bacterianas mixtas. Esto optimiza el tratamiento en infecciones respiratorias, digestivas y sistémicas en animales de producción.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



BOVINOS, PORCINOS, OVINOS, CAPRINOS, BÚFALOS Y CANINOS.

SEPTIBRON FORTE TF, está indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y sistémicas causadas por bacterias sensibles a **Tylosina** y **Florfenicol**, tales como: *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma bovis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Es eficaz en el tratamiento de infecciones mixtas en bovinos, cerdos, ovinos, caprinos y búfalos, principalmente en patologías respiratorias, metritis, mastitis y necrobacilosis. *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *P. multocida*, *P. haemolytica* y *Haemophilus spp.*



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Bovinos, Búfalos, Ovinos, Caprinos y Caninos:

Dosis recomendada:

Florfenicol: 15 mg/kg de peso corporal.

Tilosina: 10 mg/kg de peso corporal.

Equivalente a 1 ml de **SEPTIBRON FORTE TF** por cada 10 kg de peso corporal.

Vía intramuscular: Inyección en el músculo del cuello (Bovinos, Búfalos, Ovinos y Caprinos)

Vía intramuscular: Inyección en una zona muscular adecuada (Caninos).

Frecuencia: Administrar una dosis inicial y repetir a las 48 horas si es necesario.

Porcinos (cerdos):

Dosis recomendada:

Florfenicol: 6.6 mg/kg de peso corporal.

Tilosina: 3.3 mg/kg de peso corporal.

Equivalente a 1 ml de SEPTIBRON FORTE TF por cada 30 kg de peso corporal.

Vía intramuscular: Inyección en el músculo del cuello.

Frecuencia: Dosis única y repetir a las 48 horas si es necesario.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ❖ Reacciones locales en el lugar de la inyección, como inflamación, enrojecimiento y dolor.
- ❖ Reacciones alérgicas, incluyendo urticaria, edema perianal y, en casos raros, choque anafiláctico.
- ❖ En animales susceptibles, puede observarse diarrea transitoria o anorexia.

CONTRAINDICACIONES

- ❖ Contraindicado en equinos debido a la sensibilidad de esta especie a los componentes del producto, lo que podría ocasionar efectos adversos graves.
- ❖ No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a macrólidos o fenicoles.
- ❖ Contraindicado en animales con insuficiencia hepática o renal grave.

SOBREDOSIFICACIÓN

En casos de sobredosis, se pueden observar signos clínicos como: anorexia, diarrea y depresión.

El tratamiento debe ser sintomático y de soporte, con rehidratación adecuada y monitorización del estado clínico del animal.

TIEMPO DE RETIRO

Bovinos:

Carne: 28 días.

Leche: No recomendado para vacas lecheras productoras de leche para consumo humano.

Ovinos y Caprinos:

Carne: 21 días.

Leche: No recomendado para animales lecheros productores de leche para consumo humano.

Cerdos:

Carne: 14 días.

Búfalos:

Carne: 28 días.

Leche: No recomendado para búfalas lecheras productoras de leche para consumo humano.

INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES

- ❖ Tylosina y Florfenicol pueden interactuar con otros antimicrobianos bacteriostáticos. No se recomienda su uso concomitante con antibióticos de la misma clase sin la supervisión de un veterinario.
- ❖ No administrar conjuntamente con otros antibióticos bactericidas o fármacos que puedan interferir con la síntesis de proteínas, tales como cloranfenicol o lincomicina.
- ❖ Evitar el uso simultáneo con otros medicamentos que puedan provocar reacciones alérgicas o que sean nefrotóxicos.

PRECAUCIONES A PERSONA QUE ADMINISTRE MEDICAMENTO

- ❖ Las personas con hipersensibilidad conocida a florfenicol o polietilenglicoles deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- ❖ Este medicamento veterinario puede producir irritación en la piel y ojos.
- ❖ En caso de derrame accidental sobre la piel, lavar con agua.
- ❖ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante cantidad de agua.
- ❖ Usar gafas de protección personal al manipular el medicamento veterinario.
- ❖ Se debe buscar consejo médico si persiste la irritación.
- ❖ El florfenicol y el polietilenglicol pueden causar hipersensibilidad (alergia).

ADVERTENCIAS PARA ESPECIES DE DESTINO

El medicamento veterinario preferiblemente debe ser empleado posteriormente a una confirmación de infección bacteriana y prueba de sensibilidad (antibiograma), ya que el uso inapropiado del medicamento veterinario puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes al Florfenicol.

PERÍODO DE VALIDEZ

Período de validez del medicamento veterinario empaquetado para la venta: 2 años.

Período de validez después de la apertura del envase: 28 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ❖ Usar diferentes sitios de inyección en tratamientos prolongados para evitar irritación local.
- ❖ Evitar el uso en animales inmunocomprometidos o en tratamiento con otros antibióticos de acción similar.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA

Gestación: No administrar en hembras gestantes, especialmente durante los primeros 30 días de la gestación, a menos que sea estrictamente necesario y bajo supervisión de un veterinario.

Lactación: No utilizar en vacas, cabras o búfalas, cuya leche se destine para el consumo humano. No administrar en cerdas lactantes a menos que se considere esencial y bajo prescripción veterinaria.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

El producto debe conservarse herméticamente cerrado hasta el momento de su uso. Almacenar en el envase original y conservar en lugar fresco y seco protegido de la luz intensa, en un rango de temperatura entre 15-30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIONES

Contenido neto: 20, 50, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
Nº de registro: INSAI2041PN33N0530700.

