



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

SEPTIBRON FORTE

**ANTIBACTERIANO, ANTIINFLAMATORIO,
ANTIPIRÉTICO**

Solución Inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

SEPTIBRON FORTE es una solución antibiótica-analgésica-antiinflamatoria, expectorante, secretolítico y antihistamínica. Los antibióticos incluye una asociación de dos antibióticos bacteriostáticos: Florfenicol y Lincomicina que permiten tener un rango amplio de acción contra bacterias gram positivas y negativas que afectan a rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos) y porcinos. Además posee Dipirona sódica que tiene efecto analgésico ayudando a contrarrestar el dolor y junto con la Dexametasona base favorece el proceso antiinflamatorio ya que se combinan un analgésico no esteroideo con uno de origen esteroideo. Por poseer un agente expectorante secretolítico balsámico como el Gliceril Guayacol Éter y la Prometazina HCl un agente antihistamínico (un derivado fenotiazínico que compite en el bloqueo de los receptores de histamina H1, con acción sedativa, antiemética y efectos anticolinérgicos) se favorece la acción mucolítica y antialérgica que promueve la pronta recuperación de patológicas respiratorias en animales domésticos.

COMPOSICIÓN

Florfenicol.....	15 g
Lincomicina HCl.....	5,7 g
Dipirona.....	2,8 g
Dexametasona.....	7 mg
Guayacolglicerileter.....	3 g
Prometazina HCL.....	0,15 g
Lidocaina base.....	0,4 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Florfenicol, un antibiótico sintético de amplio espectro, inhibe la síntesis de proteínas bacterianas a nivel 50S del ribosoma, actuando principalmente como bacteriostático, aunque puede ser bactericida en altas concentraciones. La Lincomicina, perteneciente al grupo de las Lincosamidas, también inhibe la síntesis proteica bacteriana al unirse a la subunidad 50S del ribosoma, impidiendo la unión del ARN de transferencia. Su actividad es principalmente bacteriostática, pero puede ser bactericida a altas concentraciones.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Porcinos, Bovinos, Ovinos y Caprinos.**

Porcinos: En cerdos para prevenir y tratar la neumonía enzootica, (*Mycoplasma hyopneumoniae*), Enteritis Proliferativa, Ileitis y Disentería Porcina.

Bovinos, Ovinos y Caprinos: Tratamiento de enfermedades respiratorias, incluyendo la enfermedad respiratoria bovina (ERB) de frecuente aparición en animales en confinamiento debidas a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* y *Trueperella pyogenes*. Diarrea de terneros. Queratoconjuntivitis. Pododermatitis causada por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus* Infecciones del tracto genital, endometritis. Infecciones en general.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos:

Vía IM: 20 mg/kg de peso vivo (1 mL/15 kg p.v.) administrado dos veces con un intervalo de 48 horas utilizando una aguja de calibre 16.

Vía SC: 40 mg/kg de peso vivo (2 mL/15 kg p.v.) administrado en una única dosis utilizando una aguja de calibre 16.

El volúmen administrado por punto de inyección no debe exceder 10 ml.

La inyección debería darse sólo en el cuello.

EFECTOS SECUNDARIOS

- ✓ Ocasionalmente puede producirse dolor e irritación local después de la administración intramuscular de SEPTIBRON FORTE.
- ✓ Durante el período de tratamiento puede producirse un descenso en la ingesta de alimentos y un reblandecimiento de las heces transitorio. Los animales tratados se recuperan rápida y completamente tras finalizar el tratamiento.

- ✓ La administración del medicamento por vía intramuscular puede causar lesiones inflamatorias en el punto de inyección que persisten durante 14 días. La inflamación en el punto de inyección se puede prolongar hasta 32 días.
- ✓ La administración del medicamento por vía subcutánea puede causar hinchazón e inflamación en el punto de inyección que puede persistir hasta 41 días.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en toros adultos utilizados con fines reproductivos.
- × No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
- × No usar en caso de resistencia a la sustancia activa.
- × En caballos, ni animales que padezcan infecciones preexistentes por *Monilia spp.*

SOBREDOSIFICACIÓN

La dosificación de dosis más elevadas de las recomendadas puede ocasionar una diarrea pasajera o heces blandas.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 30 días

Leche: su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✎ Desinfectar la aguja antes de extraer cada dosis.
- ✎ Utilizar una jeringa y aguja secas y estériles.
- ✎ El medicamento debe ser utilizado junto con ensayos de sensibilidad y tener en cuenta políticas antimicrobianas oficiales y locales.
- ✎ No administrar en ningún caso más de 7 días.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20, 50, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
Nº de registro: INSAI2041PN33N072928

