



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

SULFATRIM SOLUCIÓN ORAL

ANTIBACTERIANO



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



SULFATRIM SOLUCIÓN ORAL esta formulado con sulfametoxipiridazina antibacteriano con acción bacteriostática, la asociación de este con el trimetoprim proporciona un efecto sinérgico particularmente potente y conduce a una acción bactericida. La combinación de estos principios activos hace de este producto una especialidad eficaz contra las patogénesis causadas por estos microorganismos presentes en enfermedades respiratorias (neumonías, sinusitis infecciosa), gastrointestinales (diarreas) y reproductivas (metritis) en las diferentes especies indicadas.

COMPOSICIÓN

Sulfametoxipiridazina (disulfonato de sodio de fenilpropanol)..200 mg
Trimetoprim (bis-fenilpropanol disulfonato de sodio).....40 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La sulfametoxipiridazina es un bacteriostático que actúa bloqueando la biosíntesis del ácido fólico necesario para la síntesis del ácido nucleico. La asociación con trimetoprim produce un mayor efecto sinérgico con acción bactericida.

In vitro, la asociación es activa contra:

Gram (+): *Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Clostridium spp.*

Gram (-): *Proteus spp, Salmonella spp, Pasteurella spp, Shigella spp, Haemophilus influenzae, E. coli, Neisseria spp, Klebsiella spp, Fusobacterium spp, Bordetella spp.*

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Terneros, corderos, cabritos y aves.**

Terneros: Neumonías, diarreas, metritis.

Corderos y cabritos: Neumonías, diarreas, metritis, pasteurelosis y salmonelosis.

Aves de corral: Colibacilosis, coriza infecciosa, sinusitis infecciosa, pasteurelosis, salmonelosis, infecciones por estafilococos y estrés. Prevención de infecciones secundarias asociadas a virus y micoplasmosis en procesos respiratorios, y prevención de infecciones debidas al estrés por vacunación, transporte o alimentación.

Producido por gérmenes sensibles a la asociación Sulfametoxipiridacina+Trimetoprim.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Aves de corral:

Dosis general: 2 ml de SULFATRIM SOLUCIÓN ORAL / 5 litros de agua de bebida (0,4 ml / litro de agua)

Dosis en casos graves: 4 ml de SULFATRIM SOLUCIÓN ORAL / 5 litros de agua de bebida (0,8 ml / litro de agua)

Administrar durante 3-5 días. En casos graves, administrar hasta 2 días después de la desaparición de los síntomas.

Terneros, corderos, cabritos:

Administrar a razón de 1 ml de SULFATRIM SOLUCIÓN/ litro de agua de bebida.

El tratamiento debe durar 2 días después de que desaparezcan los síntomas.

No administrar más de 7 días consecutivos.

EFECTOS SECUNDARIOS

En algunos casos pueden aparecer alteraciones en el tracto urinario y en el riñón: cristaluria, hematuria y obstrucción renal, reacciones alérgicas y emesis.

El tratamiento prolongado puede producir intolerancia digestiva con emesis, diarrea y anorexia.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con:

- × Hipersensibilidad a las sulfamidas.
- × Insuficiencia renal o hepática.
- × Discrasias sanguíneas.

SOBREDOSIFICACIÓN

Una sobredosis puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones hemáticas y cristaluria.

En este caso suspender el tratamiento, dar abundante agua y administrar ácido fólico.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 12 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- No administrar más de 7 días consecutivos.
- cambiar el agua de bebida cada 24 horas

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 L y 5 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0521137

