



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

TRIPANOVEX

HEMOPARASITICIDA

Suspensión oleosa inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



TRIPANOVEX es un producto veterinario cuya forma farmacéutica viene en suspensión acuosa inyectable base de sulfato y cloruro de quinapiramina esta combinación es eficaz en el tratamiento curativo y preventivo de infecciones parasitarias causadas por protozoarios hemáticos (hematozoarios) del género tripanosoma, especialmente *Trypanosoma evansi* (también conocida esta especie con los nombres de *Trypanosoma equinum*, *Trypanosoma hippicum* y *Trypanosoma venezuelense*) y *Trypanosoma vivax*.

COMPOSICIÓN

Sulfato de quinapiramida 10 g
Cloruro de quinapiramida.....6,67 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La asociación de dos sales (sulfato y cloruro) del principio activo quinapiramina en la composición, proporciona tras su administración a dosis terapéuticas, una acción inmediata debida a la rápida absorción del sulfato de quinapiramina, eliminando completamente los parásitos de la sangre y una acción prolongada debida a la formación de un depósito del cloruro de quinapiramina, a partir del cual se libera y se absorbe lentamente la quinapiramina, obteniendo un efecto quimioproláctico que protege a corto plazo los animales susceptibles de contraer la infección.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos y equinos.**

- Tratamiento preventivo y curativo de la tripanosomosis en equinos (derrengadera - peste boba - zonga - tristeza - hermosura - peste de Budare) causada por *Trypanosoma evansi*.
- Tratamiento preventivo y curativo de la tripanosomosis en bovinos (derrengadera - mal de cadera) causada por *Trypanosoma vivax*.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía subcutánea, en el centro de la tabla del cuello, repartiendo la dosis total en 2 ó 3 puntos de inyección distintos.

1. Dar un ligero masaje en el sitio de la inyección.
2. Dosificar, en dosis única, según la tabla siguiente, que indica el volumen a inyectar de la suspensión preparada en función del peso vivo del animal:

EQUINOS		BOVINOS	
kg de p.v	ml	kg de p.v	ml
50	1,5	50	2
100	3	100	4
150	4,5	150	6
200	6	200	8
250	7,5	250	10
300	9	300	12
350	10,5	350	14
400	12	400	15
450	13,5	450	15
500	15	500	15

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Ligera tumefacción puede manifestarse en punto de inyección, la cual puede evitarse dando un masaje después de la aplicación.
- A dosis terapéuticas no se manifiestan efectos secundarios graves.
- En algunos casos, se observan síntomas de salivación desasosiego y temblor. Estos síntomas aumentan en animales exhaustos, acalorados, excitados o débiles, que generalmente remiten a las pocas horas cuando se les tiene en reposo, y a ser posible a la sombra y con agua su alcance.
- En caballos pura sangre estos síntomas suelen ser más marcados.

CONTRAINDICACIONES

- × Hipersensibilidad a la quinapiramina.
- × Administración en animales con afecciones renales y hepáticas.
- × No administrar el producto en vacas lactantes cuya leche se destine al consumo humano.

SOBREDOSIFICACIÓN

- ✓ No debe sobredosificarse, ya que pueden manifestarse síntomas de intoxicación y/o intolerancia atribuibles al fármaco.
- ✓ Se recomienda estimar individualmente el peso del animal a tratar antes de la administración del producto.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días. **Leche:** No usar.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Mantener condiciones de asepsia durante la administración del preparado, desinfectando previamente el tapón del frasco antes de tomar cada dosis.
- ✍ Utilizar una jeringa y aguja secas y estériles.
- ✍ La suspensión que sobre debe ser descartada.
- ✍ No mezclar con otras drogas.
- ✍ No utilizar con otros medicamentos tripanocidas 2-4 semanas
- ✍ Cuando se aplican grandes volúmenes dividir el volumen y colocar en diferentes zonas.
- ✍ No inhalar el producto y lave las manos después de manipular.
- ✍ Se recomienda administrar combinado con una terapia antioxidante que permita recuperar el equilibrio REDOX lo antes posible.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0518402

