



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

TRYPAZOL

TRIPANOCIDA - ENDOPARASITICIDA

Suspensión Oleosa Inyectable

Agitar el envase antes de usar



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



TRYPAZOL SUSPENSIÓN OLEOSA INYECTABLE, está diseñado para facilitar las tareas de aplicación de tratamientos antiparasitarios en zonas tropicales con alta incidencia de trypanosomosis, parásitos gastrointestinales y pulmonares.

COMPOSICIÓN

Cloruro de isometamidio clorhidrato..... 15 mg
Albendazol sulfoxido (Ricobendazol)..... 200 mg
Excipientes C.S.P.....1 ml

MECANISMO DE ACCIÓN

Ricobendazol: Actúa sobre los parásitos mediante dos mecanismos de acción; inhibe la polimerización de la tubulina e inhibe el sistema enzimático fumarato reductasa.

Isometamidio: El modo de acción del isometamidio es a través de la inhibición selectiva de la topoisomerasa cinetoplásica tipo II del tripanosoma.

Con TRYPAZOL ambas acciones pueden realizarse con una sola inyección por animal, con un medicamento de eficacia probada y cuya compatibilidad galénica ha sido demostrada.



ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

Bovinos, ovinos, caprinos y búfalos:

- Tratamiento curativo y profilactico de la Trypanosomosis causada por *Trypanosoma vivax*.
- Tratamiento de las nematodosis gastrointestinales y pulmonares producidas por nematodos sensibles al albendazol, tanto formas adultas como larvas y huevos.
Nematodosis gastrointestinales : *Haemonchus contortus*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*.
- Nematodos pulmonares : *Dictyocaulus viviparus*.

- Tratamiento de cestodosis producidas por: *Moniezia expansa*.
- Tratamiento de fasciolosis aguda causada por formas adultas de *Fasciola hepatica*.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA



Bovinos, ovinos, caprinos y búfalos:

Aplicar la inyección subcutánea e intramuscular profunda, en el anca o preferiblemente en la tabla del cuello:

1 ml de solución por cada 50 kg de peso vivo (15 mg / ml de cloruro de isometamidium y 200 mg/ ml de Ricobendazol) en dosis única (equivalente a 0.3 mg de cloruro de isometamidio y 4 mg de ricobendazol/kg peso vivo).

Este tratamiento a la dosis indicada, permite el tratamiento y control de la trypanosomosis durante un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo del grado de infestación de la zona y de la sensibilidad de las cepas infectantes, así como también el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares.

Vía Intramuscular profunda: Para infestaciones de moderadas a severas, para efecto sistémico más prolongado.

Vía Subcutánea: Para infestaciones leves, tiene también un efecto sistémico prolongado.

Se recomienda repartir la dosis total en 2 puntos de inyección distintos y dar un buen masaje en el sitio de inyección después de la aplicación.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ☐ Ligera tumefacción puede manifestarse en punto de inyección, la cual puede evitarse dando un masaje después de la aplicación.
- ☐ A dosis terapéuticas no se manifiestan efectos secundarios graves.
- ☐ En algunos casos, se observan síntomas de salivación desasosiego y temblor. Estos síntomas aumentan en animales exhaustos, acalorados, excitados o débiles, que generalmente remiten a las pocas horas cuando se les tiene en reposo, y a ser posible a la sombra y con agua a su alcance.

CONTRAINDICACIONES

- × Hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.
- × Administración en animales con afecciones renales y hepáticas.

SOBREDOSIFICACIÓN

No debe sobredosificarse, ya que pueden manifestarse síntomas de intoxicación y/o intolerancia atribuibles al fármaco.

Se recomienda estimar individualmente el peso del animal a tratar antes de la administración del producto.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 30 días. **Leche:** no utilizar en animales cuya leche sea destinada para consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Mantener condiciones de asepsia durante la administración del preparado, desinfectando previamente el tapón del frasco antes de tomar cada dosis.
- ✍ Utilizar una jeringa y aguja secas y estériles.
- ✍ La suspensión que sobre debe ser descartada.
- ✍ No mezclar con otras drogas.
- ✍ No utilizar con otros medicamentos tripanocidas 2-4 semanas.
- ✍ Cuando se aplican grandes volúmenes dividir el volumen y colocar en diferentes zonas.
- ✍ Evite el contacto del medicamento con la piel y los ojos.
- ✍ No inhalar el producto y lave las manos después de manipular.
- ✍ No coma, beba o fume mientras manipule el medicamento veterinario
- ✍ Se recomienda administrar combinado con una terapia antioxidante que permita recuperar el equilibrio REDOX lo antes posible.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto 100 y 250 ml

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0520916

