



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

TYLOSINA 500 REVEEX

ANTIBACTERIANO

Polvo hidrosoluble oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



TYLOSINA 500 REVEEX es una formulación oral hidrosoluble en polvo destinada al tratamiento de patologías respiratorias aviares, infecciones musculoesqueléticas de etiología infecciosa en porcinos y afecciones podales, reproductivas y respiratorias en bovinos, cuya etiología bacteriana sea susceptible a la acción de la tilosina.

COMPOSICIÓN

Tilosina (tartrato).....	50 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

La tilosina es una mezcla de antibióticos macrólidos producida por cepas de *Streptomyces fradiae*. Está constituida principalmente por tilosina A, cuyo contenido no debe ser menor del 80%. En la mezcla también están presentes la tilosina B (desmicosina), C (macrocina), D (relomicina). Estos 4 factores representan al menos el 95% del contenido real. Antibiótico bacteriostático a dosis usuales y bactericidas a altas dosis. Actúa interfiriendo la síntesis de proteínas bacterianas, al unirse a la subunidad 50S ribosomal.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Aves, porcinos y bovinos.

Aves: prevención y control de las enfermedades respiratorias causadas por *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*.

Porcinos: prevención y control de la Disentería Vibriónica, Erisipela (*Erysipelothrix rhusiopathiae*), Neumonía Enzoótica (*Mycoplasma hyopneumoniae*), Artritis Mycoplasmica, rinitis atrófica (*Bordetella bronchiseptica*), infecciones por *Staphylococcus aureus*.

Bovinos: Para tratar el "ojo rosa" (*Moraxella bovis*), en el tratamiento de Difteria y Pododermatitis (*Fusobacterium*), metritis, Neumonías y Neumoenteritis (*Salmonella*, *Pasteurella*), colibacilosis



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral en el agua de bebida.

Pollos de engorde, pollitas reproductoras y ponedoras:

- **Preventivo:** 1 g/ litro de agua de bebida/día, durante los 3 primeros días de vida y repetir durante 1 día a la 4ta semana o en estados de estrés (vacunación, etc.).
- **Curativo:** 1g/ litro de agua de bebida/día, durante 3 días a 10 días.

Porcinos: 0.5 g/litro de agua de bebida/día, durante 3 a 10 día.

Bovinos: 2 g/ por ternero, dos veces al día, durante 2 semanas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- En tratamientos prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas.
- En cerdos se puede observar eritema y prurito en la piel, edema de las mucosas del ano y vulva y en casos extremos prolapso rectal. En casos graves aparecen petequias en la piel.
- En bovinos se presenta aumento de la frecuencia del pulso y los movimientos respiratorios.
- En aves hay reducción del título de anticuerpos.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a lechones que pesen menos de 3 kg. a menos que se pueda dosificar con gran exactitud.
- × No administrar a animales con insuficiencia renal o hepática.
- × No administrar en animales recién nacidos.
- × No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.
- × No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a los macrólidos.
- × No administrar a equinos ya que el uso en ésta especie, puede ocasionar diarreas severas.
- × No administrar a vacas lecheras en producción.
- × No administrar concomitantemente con antibióticos bactericidas.
- × Debe evitarse la administración de vacunas vivas o atenuadas producidas con organismos que son sensibles a la tilosina durante el tratamiento y al cabo de una semana después de la administración de TYLOSINA 500 REVEEX.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad en todas las especies.

TIEMPO DE RETIRO

Carne de bovinos: 21 días. **Cerdos:** 14 días.

Aves: 5 días. **Huevos:** 5 días. **Leche:** no administrar en vacas lecheras en producción

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✓ Se recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación.
- ✓ En caso de contacto del producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua.
- ✓ No comer ni fumar durante la manipulación del producto.
- ✓ En aves, el agua medicada debe ser la única fuente de agua.
- ✓ Se recomienda cambiar el agua cada 24 horas.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 g, 250 g, 500 g y 1 Kg

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
Nº de registro: INSAI2041PN33N076104

