



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

VITAMINA AD3E + COMPLEJO B

SUPLEMENTO VITAMINICO

Solución oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

VITAMINA AD3E + COMPLEJO B, Suplemento vitamínico oral de uso veterinario, en forma de solución líquida, aporta vitaminas liposolubles (A, D3, E, K3) e hidrosolubles (complejo B, nicotinamida, ácido pantoténico y ácido fólico) para prevenir y corregir deficiencias vitamínicas, apoyar el metabolismo energético, el crecimiento, la producción y la recuperación post-enfermedad o estrés..

COMPOSICIÓN

Vitamina A.....	45.000.000 UI
Vitamina D3.....	4.500.000 UI
Vitamina E.....	11,25 g
Vitamina B1.....	9 g
Vitamina B2.....	4,6 g
Vitamina B6.....	2,25 g
Vitamina B12.....	22,5 mg
Vitamina K3.....	9,01 g
Nicotinamida.....	45 g
Ácido pantoténico.....	18 g
Ácido fólico.....	0,45 g
Excipientes c.s.p.....	1000 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

Potenciar funciones metabólicas, reproductivas, inmunológicas y estructurales del animal, especialmente cuando ciertas especies tienen requerimientos específicos o dificultades de absorción. Por ejemplo, la vitamina A regula la diferenciación celular y la función epitelial, mientras que la D3 favorece la homeostasis del calcio y el fósforo, esenciales para el desarrollo óseo. Ambas, junto a la vitamina E que protege las membranas celulares contra la oxidación, interactúan sinérgicamente para mantener tejidos saludables y fortalecer el sistema inmunológico. Además, la vitamina K participa en la coagulación, siendo especialmente relevante ante tratamientos que involucren riesgo de hemorragia. Por otro lado, las vitaminas del complejo B (como la tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico, pantoténico y nicotinamida) tienen roles vitales en el metabolismo energético, síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y formación de células sanguíneas y mielina. Promueve un funcionamiento óptimo del sistema nervioso, cardiovascular y digestivo, además de ayudar en periodos de crecimiento, gestación, lactancia o recuperación de enfermedades. La correcta combinación y activación metabólica de estas vitaminas favorece su absorción y efectividad, haciendo de este tipo de medicamentos herramientas indispensables para el bienestar animal.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Aves, bovinos, ovinos caprinos, equinos y conejos.**

Indicado para problemas de avitaminosis, convalecencias, enfermedades carenciales (infertilidad, raquitismo, alopecia), retraso en el crecimiento, disminución de la puesta, encefalomalacia en las aves, estimulante de producciones.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral en el agua de bebida.

Aves: 0.15 ml / litro de agua de bebida.

Conejos: 2 ml / litro de agua de bebida.

En bovinos, equinos, ovinos y caprinos: Administrar por vía oral directa con jeringa dosificadora. Dosis: 1 mL por cada 50 kg de peso vivo. No diluir en agua de bebida. 1–2 veces al día, durante 5–7 días (o a criterio del Médico Veterinario).

En aves y conejos, asegurar que el agua tratada sea la única fuente de bebida durante el periodo de tratamiento para garantizar ingesta adecuada.

El medicamento preparado deberá ser consumido totalmente dentro de las 24 horas siguientes a su preparación, el remanente deberá ser eliminado de forma segura.

EFECTOS SECUNDARIOS

En raras ocasiones pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad.

CONTRAINDICACIONES

- × En pacientes con hipersensibilidad al ácido fólico o a cualquier componente de la fórmula.
- × En pacientes que padezcan de úlcera y otras afecciones del tracto digestivo y de hígado.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se presentan problemas por sobredosificación accidental. La intoxicación corresponde a un proceso crónico que cursa con igual sintomatología que la enfermedad que se pretende curar: descalcificación, esterilidad, alteraciones fetales y epiteliales. En tal caso suprimir el tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✓ El agua medicada debe prepararse en el momento de su consumo ya que las vitaminas se descomponen rápidamente en presencia de calor, luz y oxígeno.
- ✓ Debe consumirse en un plazo no mayor de 24 horas.
- ✓ No debe sobrepasar la dosis recomendada.
- ✓ La absorción de Vitamina A es inhibida por la ingestión de aceite mineral.
- ✓ Este producto debe guardarse en un lugar seco, protegido de la luz y el calor.
- ✓ Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los NIÑOS

UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN, LACTANCIA Y POSTURA

No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIONES

Contenido neto: 1 L , 1 galón y 5 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N075478

