




CATÁLOGO

PRODUCTOS

HEMOPARASITICIDAS

TRIPANOCIDAS • ANAPLASMICIDAS • BABESIOCIDAS

PRODUCTOS PARA EL

CONTROL DE VECTORES



HEMOPARÁSITOS

Los hemoparásitos de mayor importancia en los bovinos son: *Trypanosoma sp.*, *Anaplasma sp* y *Babesia sp*, siendo estos dos últimos los causantes de la enfermedad conocida como “fiebre de garrapatas”. Todos estos agentes se caracterizan por producir como sintomatología general: fiebre, enflaquecimiento, anemia, baja producción de carne y leche y abortos.

Las pérdidas económicas ocasionadas por los hemoparásitos y sus vectores han sido estimadas a nivel mundial en más de 5 billones de dólares y entre ellas se destacan la anaplasmosis y la babesiosis, conocidas como fiebre de garrapatas y la tripanosomosis, entidad que comparte algunos síntomas con las anteriores noxas y cuya identificación a nivel de campo es difícil, siendo necesario para ello recurrir al diagnóstico en laboratorio.

Las pérdidas ocasionadas por los hemoparásitos en la ganadería bovina pueden ser:

- Directas:**
 - Mortalidad animal,
 - Pérdida de peso,
 - Disminución de la fertilidad
 - Reducción en la producción de leche
 - Abortos
- Indirectas:**
 - Costos de compuestos químicos para el tratamiento
 - Las limitaciones al mejoramiento genético

A pesar de ser uno de los sectores económicos más importantes, uno de los principales problemas por los cuales atraviesa la ganadería es el aumento del nivel de infección por hemoparásitos, generando así problemas sanitarios y de manejo. Las hemoparásitos son enfermedades endémicas, por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar en climas muy cálidos y tierras bajas, afectando a equinos, caprinos, ovinos, búfalos, bovinos y camélidos.

La aplicación de baños garrapaticidas efectivos realizados a los bovinos, disminuyen la población de garrapatas vectores y por tanto la posibilidad de infección con *Babesia sp*.

HEMOPARÁSITOS

En contraste, la infección por los parásitos *Anaplasma marginale* y *Trypanosoma sp* no disminuyen, pues la garrapata no es el único vector para la transmisión de *Anaplasma marginale*; teniendo presente que para *Trypanosoma sp* y *Anaplasma sp*, los insectos picadores (principalmente los tábanos) están muy ligados a la transmisión mecánica de la enfermedad. La caracterización de vectores muestra a *Haematobia irritans* como la mosca más frecuente en el trópico (97,1 %), seguida de *Stomoxys calcitrans* (2,8 %) y tabánidos. Se encontró *T. vivax* y *T. evansi* en proboscide y tórax-abdomen de las moscas picadoras *Haematobia irritans* y *Stomoxys calcitrans*, lo que representa un comportamiento epizootico atípico al que sucede en países de Suramérica. Por su alta densidad poblacional, se sugiere la mosca *Haematobia irritans* como el principal potencial vector.

Igualmente, las infecciones iatrogénicas son de gran importancia para la transmisión de la anaplasmosis y tripanosomiasis: se han observado elevaciones en las incidencias de anaplasmosis y tripanosomosis, después de las campañas de vacunación y se ha comprobado que *Anaplasma marginale* y el *Trypanosoma vivax* se puede transmitir a través de agujas sin esterilizar que han sido usadas en varios animales. Para *Babesia sp* las infecciones iatrogénicas no son de significancia epidemiológica.

Existen condiciones especiales que favorecen la transmisión y persistencia de tripanosomosis y anaplasmosis:

- Densidad animal
- Movilizaciones
- Clima
- Densidad de vectores
- Manejo

En situaciones como estas, es ideal contar con un producto que ofrezca control simultáneo de ambas infecciones.

DIMINAZENE-A

Solución inyectable

COMPOSICIÓN:
Diminazene diaceturato 70 mg
Excipientes c.s.p. 1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bovinos y equinos: tratamiento curativo de la tripanosomiasis bovina causada por *Trypanosoma vivax*. Tratamiento curativo de la tripanosomiasis equina causada por *Trypanosoma evansi*, también conocido como *T. equinum*, *T. hippicum* y *T. venezuelense*. Tratamiento curativo de la Babesiosis (Piroplasmosis) bovina y equina. Tratamiento curativo de infecciones mixtas por tripanosomas y babesias en ambas especies.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Administrar por vía intramuscular profunda.
Bovinos y Equinos: 1 ml/20 kg PV (3.5 mg de diminazene diaceturato/kg PV). En caso necesario, repetir la dosis cada 24 horas.

PRESENTACIÓN:

Viales de 20 ml y 100 ml.



HEMOVEEX S.O.

Suspensión oleosa inyectable

COMPOSICIÓN:
Ivermectina 20 mg
Cloruro de Isometamidio 24 mg
Excipientes c.s.p. 1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bovinos y ovinos: tratamiento específico de la tripanosomiasis en bovinos/ovinos. Actúa contra el *Trypanosoma vivax*, *T. congolense*, *T. brucei*, *T. evansi*, Hipodermosis, nematodosis gastrointestinal, nematodosis pulmonar, paratosis externas y sarna. En todas las indicaciones señaladas anteriormente, también será efectivo contra las formas parasitarias que sean sensibles a la ivermectina.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Aplicar vía intramuscular profunda para infestaciones de moderadas a severas y vía subcutánea para infestaciones leves, ambas tienen un efecto sistémico prolongado. Aplicar en el anca o preferiblemente en la tabla del cuello repartiendo la dosis total en 2 puntos de inyección distintos y dar un buen masaje en el sitio de inyección después de la aplicación. Bovinos y ovinos: 1 ml de solución por cada 50 kg de peso vivo en dosis única.

PRESENTACIÓN:

Viales de 250 ml y 500 ml.



ISOPAN FORTE

Suspensión oleosa inyectable

COMPOSICIÓN:
Oxitetraciclina hidrocloreto 120 mg
Oxitetraciclina dihidrato 120 mg
Cloruro Isometamidium clorhidrato 10 mg
Ketoprofeno 60 mg
Vitamina B12 5 mg
Excipientes c.s.p. 1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bufalinos, caprinos, ovinos y bovinos: tratamiento curativo de la tripanosomiasis bovina causada por *Trypanosoma vivax* y de la anaplasmosis bovina causada por *Anaplasma marginale*. Tratamiento profiláctico de la tripanosomiasis bovina causada por *Trypanosoma vivax*.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Administrar 1 ml/20 kg PV vía intramuscular profunda, preferiblemente en el centro de la tabla del cuello o en la cadera, en dosis única.

PRESENTACIÓN:

Viales de 100 ml, 250 ml y 500 ml.

IVERQUIN

Suspensión oleosa inyectable

COMPOSICIÓN:
Ivermectina 5 mg
Quinapiramina sulfato 75 mg
Quinapiramina cloruro 50 mg
Excipientes c.s.p. 1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bovinos, camélidos: tratamiento preventivo y curativo de la tripanosomiasis causada por *Trypanosoma vivax* en bovinos y por *Trypanosoma evansi* en camélidos.

Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio larvario), nematodos pulmonares (adultos y cuarto estadio larvario), nematodos oculares (adultos), hipodermosis (estadios parasitarios), ácaros de la sarna y piojos chupadores en bovino y en camélidos.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Administrar por vía subcutánea en el centro de la tabla del cuello, repartíendola en 2 o 3 puntos distintos de inyección. Aplicar una dosis de 3 ml/50 kg PV en bovinos y de 2 ml/50 kg PV en camélidos. IVERQUIN conluga en un solo producto el tratamiento antelmíntico, ectoparasitida y hemoparasitida aplicando una dosis única, facilitando de esta forma la manipulación de los animales y el tratamiento de las diferentes afecciones.

PRESENTACIÓN:

Viales de 100 ml y 250 ml.



TRIPANOVEX

Suspensión oleosa inyectable

COMPOSICIÓN:

Quinapiramina sulfato.....	100 mg
Quinapiramina cloruro	66,7 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bovinos, equinos y camelídos: tratamiento preventivo y curativo de la tripanosomiasis causada por *Trypanosoma evansi* en equinos y camelídos y por *Trypanosoma vivax* en bovinos.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Administrar por vía subcutánea en el centro de la tabla del cuello, repartiendo la dosis total en 2 o 3 puntos distintos de inyección a una dosis de 4 ml/100 kg PV en bovinos, 3 ml/ 100 kg PV en equinos y camelídos. Una sola aplicación de TRIPANOVEX a dosis terapéutica, elimina rápida y completamente los parásitos de la sangre (cura los casos clínicos), protege durante 3 meses los animales susceptibles de contraer la infección, reduce los riesgos de propagación de la enfermedad y permite mantener o aumentar de forma significativa la productividad y la rentabilidad económica del ganado.

PRESENTACIÓN:

Viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml.

TRYPANOCID

Solución extemporánea inyectable

COMPOSICIÓN:

Cloruro de isometamidio clorhidrato.....	20 mg
Agua para inyectar c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bovinos, ovinos, equinos y caninos: tratamiento preventivo y curativo de la tripanosomiasis causada por *Trypanosoma evansi* en equinos y por *Trypanosoma vivax* en bovinos.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Bovinos y búfalos: 2,5 ml/ 100 kg PV
Equinos: 2,5 ml/100 kg PV
Ovinos: 0,5 ml/20 kg PV
Perros: 0,25 ml/10 kg PV

Aplicar vía intramuscular profunda para infestaciones de moderadas a severas y vía subcutánea para infestaciones leves, ambas tienen un efecto sistémico prolongado. Aplicar en el anca o preferiblemente en la tabla del cuello repartiendo la dosis total en 2 puntos de inyección distintos y dar un buen masaje en el sitio de inyección después de la aplicación. Este tratamiento a la dosis indicada, permite el tratamiento y control de la tripanosomiasis durante un período de 2 a 6 meses, dependiendo del grado de infestación de la zona y de la sensibilidad de las cepas infectantes.

PRESENTACIÓN:

Viales de 50 ml y 250 ml.

TRYPAZOL

Suspensión oleosa inyectable

COMPOSICIÓN:

Cloruro de isometamidio clorhidrato.....	15 mg
Albendazolo sulfóxido (Ricobendazol)	200 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bovinos, ovinos, caprinos y búfalos: tratamiento curativo y profiláctico de la tripanosomiasis causada por *Trypanosoma vivax*. Tratamiento de las nematodosis gastrointestinales y pulmonares. Tratamiento de cestodosis y fasciolosis aguda.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Administrar 1 ml de solución por cada 50 kg de PV en dosis única. Aplicar vía intramuscular profunda para infestaciones de moderadas a severas y vía subcutánea para infestaciones leves, ambas tienen un efecto sistémico prolongado. Aplicar en el anca o preferiblemente en la tabla del cuello repartiendo la dosis total en 2 puntos de inyección distintos y dar un buen masaje en el sitio de inyección después de la aplicación. Este tratamiento a la dosis indicada, permite el tratamiento y control de la tripanosomiasis durante un período de 2 a 6 meses, dependiendo del grado de infestación de la zona y de la sensibilidad de las cepas infectantes, así como también el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares.

PRESENTACIÓN:

Viales de 20 ml y 100 ml.

IMIDOCARB REVEEX

85 MG/ML

Solución inyectable

COMPOSICIÓN:

Imidocarb (diproponato)	85 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bovinos y caninos: tratamiento y prevención de piroplasmosis causadas por *Babesia argentina*, *B. bigemina*, *B. bovis* y *B. divergens* en bovinos. Tratamiento de anaplasmosis causado por *Anaplasma marginale*. Tratamiento de piroplasmosis causadas por *Babesia canis*, *B. gibsoni* y *B. vogeli* en perros.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Perros: Vía intramuscular o intravenosa. Administrar de 4 a 5 mg de imidocarb/kg de peso corporal (equivalente a 0,47 - 0,58 ml/10 kg PV) en dosis única.
Bovinos: Vía subcutánea.
- Piroplasmosis: • Prevención: administrar 2 mg de imidocarb/kg PV (equivalente a 2,3 ml/100 kg PV) en dosis única • Tratamiento: administrar 1 mg de imidocarb/kg PV (equivalente a 1 ml/100 kg PV) en dosis única.
- Tratamiento de anaplasmosis: administrar 2,1 mg de imidocarb /kg PV (equivalente a 2,5 ml/100 kg PV) en dosis única. Volumen máximo por punto de inyección: 6 ml.

PRESENTACIÓN:

Viales de 200 ml y 250 ml.

ANTRINOL FORTE

Suspensión oleosa inyectable

COMPOSICIÓN:

Diminazeno diaceturato.....	70 mg
Antipirina	150 mg
Oxitetraciclina clorhidrato	140 mg
Vitamina B 12	5 µg
Excipientes c.s.p	1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Caninos, equinos, ovinos, bovinos: tratamiento de anaplasmosis bovina, babesiosis bovina, equina, canina y ovina y tripanosomiasis bovina y equina.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

En equinos ovinos y bovinos administrar 1 ml por cada 20 kg PV vía intramuscular profunda durante tres días (cada 24 horas). En perros aplicar 1 ml por cada 13 kg PV vía intramuscular profunda, en una sola aplicación.

PRESENTACIÓN:

Viales de 100 ml, 250 y 500 ml.



BUPARVAQUONA

Solución inyectable

COMPOSICIÓN:

Buparvaquona.....	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:

Bovinos, búfalos, camelidos (camellos, llamas, alpacas), ovinos y caprinos.

Tratamiento y control de la theileriosis causada por *Theileria annulata*, *Theileria parva*, *Theileria mutans* y *Theileria orientalis* (sensibilidad variable según genotipo).

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:


Dosis general: 2,5 mg/kg PV (equivalente a 1 mL/20 kg PV) por vía intramuscular profunda. En casos graves, repetir una segunda dosis 48-72 horas después.

PRESENTACIÓN:

Viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml.



DISTRIBUIDO POR:



CONTROL DE VECTORES

Control de Vectores en Ganado – REVEEX

El control de vectores es uno de los pilares fundamentales de la sanidad animal moderna, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Garrapatas, moscas, ácaros y larvas no solo causan molestias y lesiones en los animales, sino que son responsables de transmitir enfermedades que afectan seriamente la producción de carne y leche, generando importantes pérdidas económicas.

Entre los principales vectores encontramos las garrapatas, que además de provocar anemia y estrés, transmiten *Babesia*, *Anaplasma* y *Trypanosoma*, agentes del complejo tristeza bovina. Las moscas hematofagas reducen el tiempo de pastoreo y aumentan el gasto energético, mientras que las miasis y la sarna provocan lesiones cutáneas, infecciones secundarias y deterioro progresivo del animal.

REVEEX pone a disposición del productor una línea completa de soluciones para el control eficaz de estos parásitos. Estas incluyen baños de inmersión, aspersión, formulaciones pour-on, tratamientos inyectables y productos tópicos, además del control ambiental de instalaciones como corrales, mangas y establos.

Un programa moderno de control de vectores debe ser integral: tratar al animal, al ambiente y al ciclo del parásito, combinando el uso racional de productos con la rotación de principios activos y el monitoreo permanente del rebaño.

Mantener animales libres de ectoparásitos es una condición indispensable para mejorar la productividad, proteger la sanidad del hato y cumplir con las exigencias sanitarias de movilización y exportación.

Con **REVEEX**, el productor cuenta con herramientas confiables para proteger la salud animal y asegurar una ganadería más rentable y sostenible.

AMITRAZ 12,5% Solución emulsionable externa

COMPOSICIÓN:

Amitraz.....	125 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO e INDICACIONES:

Bovinos, ovinos y caprinos: ectoparasitícida de amplio espectro. Garrapaticida, piojicida y sarnicida. Especialmente indicado para combatir ácaros resistentes a otros principios activos (órgano-fosforados, piretroides).

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Bovinos: baños de inmersión o aspersión. Diluir 1 L por 700 L de agua.
Ovinos y caprinos: baños de inmersión. Diluir 1 L por 350 L de agua.

PRESENTACIÓN:

Envases de 286 ml y 1 L.



CIPER-VEEX 20% Solución emulsionable externa

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina	200 mg
Excipientes y estabilizadores c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO e INDICACIONES:

Bovinos, ovinos, porcinos y aves: ataca garrapatas de un sólo huésped (género *Boophilus*), garrapatas de varios hospederos (géneros *Amblyomma* y *Rhipicephalus*), ácaros de sarna (aradores y mordedores), pulga, piojos chupadores (maltragos), gusano barrenador, tór-salo, mosca de la paletilla y de los cuernos, piojillo colorado de las aves, llagas del verano del equino (causadas por *Habronema spp.*), etc.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Baños por inmersión: 1 ml por cada litro de agua. En la recarga administrar la misma dosis.

Baños por aspersión: 1ml por cada litro de agua.

Fumigación de instalaciones: 10 ml por litro de agua.

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 L.



DELTA METRINA 0,75% POUR-ON

Emulsión Pour-on

COMPOSICIÓN:

Delta metrina	7,5 mg
Excipiente c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO e INDICACIONES:

Ayuda al control de parásitos externos producidas por los siguientes ectoparásitos en ganado bovino y ovino: garrapatas, moscas, mosquitos y piojos.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Aplicar el medicamento vertiendo la dosis necesaria a lo largo de la línea dorsal, desde la cruz hasta la cola.
 Infestaciones por garrapatas: 15 ml de medicamento por cada 100 kg PV.
 Infestaciones por moscas: 10 a 30 ml según peso del animal
 Infestaciones por piojos: 10 a 20 ml según peso del animal
 Ovino: 10 ml por animal.

PRESENTACIÓN:

Envases dispensadores de 150 ml, 500 ml, 1 L y 2,5 L.

FIPROVET-GAN

Solución emulsionable externa

COMPOSICIÓN:

Fipronilo	10 mg
Permetrina	50 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO e INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento y control de los siguientes parásitos externos de los bovinos:

- Garrapatas (*Rhipicephalus* [Boophilus] *microplus*)
- Mosca del cuerno (*Haematobia irritans*)
- Piojos masticadores (*Damalinia bovis*)
- Piojos chupadores (*Limognathus vituli*)
- Miasis nodular (*Dermatobia hominis*)

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Bovinos: 1 L en 700 L de agua. Cerdos y pequeños rumiantes: 1 L en 350 L de agua. Aplicar en pulverización o en baño de inmersión. Debe aplicarse a todos los animales del rebaño dentro de un programa planificado de control de parásitos externos. El intervalo de tratamiento puede ser de al menos 2 meses, pero dependerá de la severidad de la infestación, condiciones ambientales y condiciones del rancho.

PRESENTACIÓN:

Frascos de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 1 galón.

MATAGUSANOS REVEEX

Aerosol tópico

COMPOSICIÓN:

Clorpirifos	60 mg
Flufenicol	10 mg
Violeta genciana	2 mg
Aceite de pino	200 mg
Excipiente y propelente c.s.p.	1 ml

INDICACIONES:

Tratamiento preventivo y curativo de miasis de las heridas (gusaneras de las heridas) y de infecciones en heridas o lesiones producidas por corte de ombligo, descornes, corte de cola, castraciones, intervenciones quirúrgicas, picaduras de moscas y garrapatas.
 Curación y cicatrización de heridas o lesiones no infectadas.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Administrar por vía tópica.
 Preventivo: Pulverizar una sola vez sobre la herida o lesión. En caso necesario, repetir la aplicación.
 Curativo: Pulverizar una vez al día hasta la completa cicatrización de la gusanera o herida. Como repelente de insectos, pulverizar sobre zonas con exudados (pus, sangre, etc.).

PRESENTACIÓN:

Envases aerosol con 160 ml y 354 ml.

VECTOR

Aerosol tópico

COMPOSICIÓN:

Clorpirifos	60 mg
Violeta de genciana	2 mg
Aceite de pino	92,5 mg
Solventes y propelentes c.s.p.	1 ml

ESPECIES DE DESTINO e INDICACIONES:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y camellos.
 Prevención y tratamiento de miasis o gusaneras de las heridas en el ganado. Prevención y tratamiento de lesiones infectadas en descornes, castraciones, cura de ombligos y despuentes.
 Curación y cicatrización de heridas no infectadas.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Dirija la válvula hacia el sitio afectado a unos 30 cm de distancia y presione rociando el producto hasta cubrir totalmente el área afectada.
 Aplicar una sola vez en heridas no infectadas. En caso de gusaneras o miasis aplicar abundante cantidad del producto en el interior de la zona afectada durante 6-7 días hasta su total curación.

PRESENTACIÓN:

Aerosoles de 160 y 354 ml

PASTA CRISTAL MATAGUSANOS

Pasta tópica

COMPOSICIÓN:

Clorpirifos.....	60 mg
Aceite de pino	350 mg
Excipientes c.s.p.....	1 g

ESPECIES DE DESTINO e INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de gusaneras de las heridas (miasis de las heridas) y de infecciones en heridas producidas por castraciones, corte de ombligo, corte de cola, corte de orejas, descornes, despuñtes, picaduras de insectos y garrapatas. Tratamiento local de lesiones causadas por el gusano de monte. Curación de todo tipo de heridas. Repelente de insectos.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Administrar por vía tópica, mediante un hisopo o brocha. En heridas sin gusaneras o no infectadas, aplicar una ligera capa. En heridas con gusaneras o infectadas, aplicar abundante producto en el interior y bordes de las mismas, diariamente o cada 2 días, hasta la completa curación. Como repelente de insectos en zonas de la piel con exudados y para tratar el ombligo de animales recién nacidos, aplicar una solución de 1 parte de producto en 9 partes de agua.

PRESENTACIÓN:

Envases de 180 g y 380 g.

CIPERZURON

Solución emulsionable externa

COMPOSICIÓN:

Diflubenzuron.....	6 mg
Cipermetrina	6 mg
Excipientes c.s.p.....	1 ml

ESPECIES DE DESTINO e INDICACIONES:

Porcino, bovino, caprino y ovino
Bovinos, ovinos y caprinos: lucha y control de infestaciones por garrapatas (*Boophilus microplus* y *Amblyomma cajennense*), moscas (*Haematobia irritans*, *Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis* y *Hydrotaea irritans*). Acaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis* y *Chorioptes bovis*) y piojos (*Linognathus spp.*, *Haematopinus spp.* y *Damalinia bovis*).

Porcinos: lucha y control de infestaciones por ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*), piojos (*Haematopinus suis*) y moscas.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Baño por aspersión o baño por inmersión:
Bovinos: diluir 1 L de CIPERZURÓN en 700 L de agua.
Ovinos: caprinos y porcinos: diluir 1 litro de CIPERZURÓN en 350 L de agua.

PRESENTACIÓN:

Envase de 286 ml, 1 L y 1 galón.





reveex.com